


**PRODROMO DI
FISICA
VEGETABILE DI
ANDREA
COMPARETTI ..**



In Anatomia corporum organicorum (qualia sunt hominis & animalium) opera sane recte & utiliter insumitur, & videtur res subtilis, & scrutinium Naturæ bonum —. Verum hoc ipsum obvium quiddam est, & in promptu situm præ Anatomia vera schematismi latentis in corporibus, quæ habentur pro similaribus; præsertim — in partibus similaribus plantæ, — veluti radicis, folii, floris —. Facienda est corporum separatio — & per inductionem veram cum experimentis auxiliaribus, & per comparisonem ad alia corpora —; si in animo sit veras corporum texturas, & schematismos — in lucem protrahere. Id. Verul. l. c.



U Na serie di particolari osservazioni, e di
 sperienze sulla struttura interna delle par-
 ti differenti delle piante presenta un sag-
 gio generale dell'organizzazione vegetabile. Non è que-
 sto un parto secondo d'ingegno sublime, ma un sem-
 plice frutto di sottile notomia. Un meccanismo di
 parti simili con combinazioni, e rapporti poco variati, a-
 nimato da potenze uniformi, e forse del medesimo ge-
 nere, ricercava l'analisi delle più minute differenze. La
 prima, e continua progressione in questa si riconosce
 dall'uso di una consimile negli esseri prossimi; che for-
 mano gli ultimi gradi della scala del regno animale. La
 notomia particolare degli insetti, e de' vermi servì di
 molto utile preparazione a quella delle piante. Il tem-
 po impiegato lungamente in quella dirozzò la ma-
 no, corresse l'occhio, avvezzò la mente; preparò ogni

mezzo per agevolare l'ingresso nel nuovo campo , e per far riconoscere tosto li rapporti delle parti simili de' due regni, che formano gli anelli della scala degli esseri organizzati. Nonpertanto la folla degli ostacoli eminenti avrebbe arrestato ogni progresso alla risoluzione , se una moltitudine di ripetizioni , e di confronti in ogni senso non avesse appianata la via , ed una serie ordinata di sperienze non avesse dissipate le ombre d'una selva ben regolare , ed uniforme , ma troppo folta per penetrarvi ne' più cupi nascondigli , e per iscovrire li più riposti principj. Il lungo processo d'un tale travaglio non è l'oggetto del presente mio prodromo. Il desiderio , che ho di rendere conti alcuni risultati, risguarda il valore di qualche scoperta, se vi avesse, particolare , onde non degradingli , o si confonda al confronto , ed alla prova della preminenza .

Cominciando le ricerche analitiche dalla prima lamina dell'involuppo comune delle piante, presentaronsi tosto in questa li principj di vera , e composta organizzazione. L'epidermide , levata dalla scorza la più fresca de' rami estremi , e teneri di alcuni alberi , dal tronco , e da' rami di molti frutici , dal fusto , dal picciuolo , dal peduncolo , dalla foglia , dal calice , dalla corolla , dagli stami , da' pistilli , dal pericarpio , dal ricettacolo di parecchie piante , dimostrò una qualche varietà nella grossezza , consistenza , e contrattilità , ma una costanza nella particolare sua tessitura . La più manifesta però si rinvenne nell'epidermide delle foglie di alcune specie de' generi delle famiglie de' gigliacei , delle

le porcellane, de' semprevivi, delle onagre, de' bliti, de' titimali, delle borragini, de' composti, de' papaveri. Nè fu essa punto oscura ne' fiori maggiori de' gigli, de' gli iridi, delle malve, delle onagre.

L'epidermide adunque è tessuta di fili a guisa di rete, le cui aree non sono romboidi, ma esagone co' lati più, e meno ineguali in lunghezza, e grossezza sì, che li verticali, o laterali secondo la lunghezza della foglia sogliono essere maggiori degli obliqui, e degli orizzontali. Li fili poi si compresero per veri vasellini; che per tal distribuzione, e connessione hanno una direzione serpentina, quasi per piani inclinati, formando aree di diversa ampiezza, e di differenti angoli ortusi, ma di simile figura. Dalla gonfiezza maggiore de' vasellini, relativa alla qualità, e freschezza della parte simile, da cui l'epidermide s'è levata, m'avvidi, che talora essi non si discernono facilmente dalle stesse aree, comparendo esse sole pellucide, concavo-convesse, o vescicose. Questa comparsa erronea si è corretta col ripetere l'osservazione in molti modi, a luce riflessa, trasmessa, più e meno intensa, e passata ora per l'asse, ed ora fuori dell'asse della lente.

Con tali perquisizioni rettificata ho potuto inoltre scoprire alcune macchinette, e punti or lucidi, ora oscuri nelle aree, che in principio aveva preso per frammenti rimasti dal distacco delle parti interne. Le macchie furono nelle diverse spezie di piante di figura diversa, cilindrica, elittica, rotonda, ed a vario intervallo, quale riscontrai specialmente nelle foglie differen-

ti, e nelle diverse superficie della foglia medesima. Una macchinetta ricorreva quando ad ogni due aree, e quando a tre, talvolta solo a quattro; ed erano distanti alcune un decimo, altre un sesto, ed altre un quarto di particella delle decimali del quarto di pollice inglese, qual osservai nelle foglie degli iridi, e della corona imperiale, ov'erano cilindriche e bianche a lume riflesso, oscure a lume trasmesso; laddove ne' fichi d'India, e negli aloè sembrarono simili, ma più rotonde. In un composto di più aree, rinchiuse nello spazio di part. 1., ho potuto numerare nella epidermide dell' aloè sino a dieci macchinette; mentre solo dieci aree in un tale spazio vidi in quella del giglio, ove perciò le macchie erano più rare. Ognuna di queste macchie secondo la lunghezza delle foglie dimostrò un' apertura, o forellino, che obliquamente s'apre verso al di sopra, siccome raccolti dal passaggio della luce a certa posizione dell' oggetto. In questa macchietta vi ho potuto anche scoprire bene spesso nelle foglie le più fresche, e soprattutto in quelle di sugo viscido, quali sono le liliacee, qualche bollicella aereo-acquosa, che ora alla parte inferiore, ora alla media, ed ora alla posteriore della macchia vi stava incarcerata, rendendola così diversamente gonfia, e pellucida. Con tal mezzo ho rilevato, che una tal macchia è realmente una macchinetta ora cilindrica, ora ovale, ora rotonda, composta di due filetti laterali, e d'un medio, tra quali appariscono le bollicelle. Ho inoltre annotato, che essa è congiunta o dal mezzo, o a' lati a' fili, o vasselli-

lini serpentini, quasi prodotta dagli angoli delle aree. Anzi in una foglia di carna, ove le macchie più oscure, e cilindriche aveano il diametro eguale alle aree, e la lunghezza quasi di una quarta parte, mi venne fatto di distaccare in parte un cilindretto, e di vederlo dall'altra annesso ad un filo, che s'era sviluppato, affatto spirale. Similmente in una foglia sugosa di iride si sviluppò un lunghissimo filo, che avea nel mezzo connesso un pezzetto cilindrico, opaco, grosso, peranco intero; mentre il filo proseguiva verso l'attacco colla lamina, mostrandovi la più bella spirale, uniforme, argentea, mobilissima, e terminando col l'attacco ad uno de' lati oscuro, e grosso d'un'area esagona. Osservando poi lungamente, ed attentamente in alcune di queste macchinette ancora intatte la bollicella incarcerata, ho anche scoperta una mutazione allo sparire della bollicella dopo alcuni minuti, facendosi le aree depresse, oscure, nere ne' bordi, pellucide in mezzo con solo puntino oscuro. Nell'epidermide grossa del cotiledone non di rado ho veduto sul fatto apparire alcune bolliccine dentro le macchinette rotonde, e pellucide; specialmente, quando restava aggiunta all'interna superficie qualche porzione della lamina interna del reticolo sugoso, e parenchimatoso. D'intorno poi la macchinetta oltre il suo forellino ne osservai molti altri minori, che ora quai punti neri, ed ora, quai punti lucidi comparivano a lume trasmesso, li quali circondano alcune eminenze piccolissime che a guisa di stellette bianchicce, e frequentissime si scovrono in sull'esterna superficie.

Simile organizzazione riscontrai nell'epidermide del calice, della corolla, degli stami, e de' pistilli de' fiori, senonchè le macchinette men patenti, e più rare, e li fili delle aree più sottili, più prossimi, e più tesi. Nell'epidermide delle petale del colchico giallo autunnale nell'intervallo di part. 1. ho potuto numerare 40. areette, ove li filetti apparivano una quinta, o sesta parte nel diametro. E siccome in molte petale le più fresche apparve notabile la corrugazione della superficie, specialmente superiore, accoppiata alla struttura retiforme la più distinta, quale rimarcai nelle corolle composte, e principalmente nelle ermafrodite del girasole, e molto più della stapelia la più fresca; così in altre men recenti la ho ravvisata diversa, come nel giglio bianco, nel convolvolo, nell'altea, nella ninfea, nell'onagra. La tessitura retiforme esterna non così distinta dimostrassi ne' grossi, e retti stami, e pistilli dell'altea, e della malva, come ne' lunghi, sottili, ed attorcigliati della maraviglia; e della sensitiva, ne' raggrinzati della centaurea; e della cicoria; negli incurvati della parietaria, e dell'ortica, nonchè ne' lunghi de' gigli, e de' convolvoli; ne' così negli anteri chiusi, e distesi dal polline, come negli aperti, e corrugati della stessa parietaria, dell'acetosa, e degli apocini.

Queste osservazioni fecero conoscere, che ben a ragione il cel. de Saussure ammise una organizzazione nell'epidermide delle foglie, sebbene nè ha egli descritta la specie di rete, nè la struttura de' corpetti miliari, o delle glandule. Dal paragone, ch'io feci di questi cogli
 sti-

stigmi veri e spurj, ch'io aveva osservati nella cute di molti insetti, e vermi, parvemi egli di rinvenirvi dall'esterno quella similitudine, che bastasse per dichiararli anche nelle piante per istigmi legittimi, e spurj. Molto più mi confermai nella dichiarazione, quando compresi il processo, e la loro relazione colle parti interne, ove compariscono o sulla superficie interna dell'epidermide, e della lamina sugosa vascolare più densa, ed opaca, o su quella del parenchima, o involuppo cellulare più e men verde, sotto la figura di corpetti ovali, bianchissimi, quasi uova di mosca, che sembrano venire dall'interno del parenchima alle macchinette esterne descritte, e che resistono a qualunque lacerazione dell'epidermide, e ad un'avanzata macerazione nell'acqua, e nell'inchostro, molto notabili, e frequenti nelle varie specie dell'aloe. Colla macerazione ho potuto anche risolverne alcuni, trovandoli composti di fibrille o rettilinee, o appena incurvate, bianche, scabre, a guisa di peluzzini di diversa lunghezza, che comprendono una qualche cavità, in cui le bollicelle talvolta vi arrestano. Quindi rilevai, perchè si trovino sotto l'epidermide del picciuolo, de' rami, e del tronco di molti arbusti, nonchè sotto il fusto dell'erbe secondo la loro lunghezza. In alcune piante vi stanno rai corpicelli più annessi al parenchima, che all'epidermide, ed in alcune altre sono appena visibili.

Sotto l'epidermide avvi una lamina vascolare sugosa, opaca, più grossa, di varia consistenza, e colore, in alcune piante bianchiccia, come nelle foglie d'endi-

divia, di lattuga, di bieta, e molto più de' tirimali, de' fichi d'India, degli aloè, de' semprevivi, de' cotiledoni, in altre gialliccia, come nella celidonia, in altre rossigna, come nel fusto, e nel picciuolo, e nelle coste della fitolacca, della parietaria, e di diversi colori nelle petale delle corolle. Facilmente la ho distinta nella cute della lattuga, e della centaurea, quando, distaccandosi l'epidermide, vi si ebbe una lamina, che era in parte tenuissima, pellucida, pertugiata, ed in parte grossa, opaca, bianchiccia. Ne' semprevivi, negli aloè, nelle tante comparve più grossa, e più aderente sì all'epidermide esterna, che al parenchima interno. Nelle petale del girasole di color aureo, ed in quelle del papavero di color rosso sull' interna superficie dell' epidermide compariva, mentre il parenchima seguente era bianchiccio, da cui ho potuto separarla, osservando il rapido aggrinzamento, e attorcigliamento della lamina aurea, e rossa, ed il restringimento del tessuto bianco cellulare. Ho però avvertito, che nelle diverse piante è più e meno opaca, e che anzi generalmente nella superficie inferiore delle foglie suol essere più, che nella superiore, qual vidi nel piantaggine, nella fitolacca in guisa, che l'epidermide superiore nel distacco dimostrò la rottura di vescichette acquose, pellucide, che bagnano sì la superficie interna dell' epidermide, che quella del parenchima. Rare volte vi ho riuscito a distaccarla sì bene anche nelle foglie, che le vescichette restassero intere, ed eminenti sulla superficie del parenchima. Non pertanto talora fin nelle petale del gi-
glio

glio mi venne fatto di scorgerla intatta sì, che, separata l'epidermide, sol dopo qualche tempo si vide l'umore umettare il parenchima. Ho avvertito inoltre che dalla più leggera macerazione, ed appassimento, sminuendosi il grado di sua capacità, più difficilmente si distingue. Osservando una petala di giglio bianco, mentre cominciava ad appassire, e a macerarsi insieme, vidi, che essa in parte era divenuta pellucida, ed in parte opaca rimaneva, ma che questa a leggera compressione colle dita si minorava. La foglia del semprevivo maggiore nell'interna superficie della cute mostrò questa lamina opaca, cinerizia con macchie più bianche, come di pelettri di velluto attorcigliati, che riempivano le aree retiformi. La foglia di porcellana bene spesso rappresentò una tal lamina sulla superficie verde del parenchima, e nelle varie cellette, o interstizj di esso, ove essendovi pure o il vacuo, o le vescichette, o bollicelle raccolte, compariscono li punti lucidi.

Il parenchima, o involucro cellulare, esaminato distintamente nelle piante sugose, e singolarmente nelle foglie crasse, e nelle carnose, ove abbonda, dell'aloe, del fico d'India, del bellico di Venere, della porcellana, del semprevivo, si conobbe essere un tessuto composto di vascellini finissimi, e di granelli glandulari, ravvolti in una sostanza verdeggianti, e glutinosa; il quale mostra un apparato di vescichette per le bollicelle aqueo-aeree, che vi si sviluppano, e restano intercette nelle aree tra' fili per ogni verso intralciati. La foglia
del-

della porcellana ortense, ben osservata a lume riflesso dalla superficie superiore, dimostrò all'interno una particolare congerie di tubercoli, o monticelli verdi con peletti bianchi frapposti, più grandi, e men levigati verso la superficie inferiore. La sostanza verde, aderente alle coste, o a' pacchetti vascolari, e alle loro diramazioni, è più espansa a' lati, e va crescendo in progresso, finchè termina tra le aree pellucide con uno, due, e tre tubercoli li più verdi con punto medio gialliccio trasparente. Nelle larghe osservai le bollicelle aeree, quali vescichette di diversa grandezza, e figura, per lo più rotonda, o ovale, che fanno comparire li punti lucidi tra la sostanza verde per la luce trasmessa, e riflessa. Ho poi rilevato, che le stesse aree grandi sono attraversate da fili sottilissimi, brevissimi, appena verdolini, quasi a rete la più fina irregolare tessuti. Sebbene ciò meglio si scopersse, levata l'epidermide delicatamente, restandovi intatte le aree, e le bollicelle, onde si videro insieme molti granellini, o fiocchetti più verdi oscuri. Nella foglia del cardo il parenchima apparve tessuto di fili per lungo inflessi, o serpentinati, e di trasversi più brevi, onde si formano le cellule bislunghe, e composte non di lamine, ma di fili, aperte, qual rocca, nelle quali restano incarcerate le bollicelle aeree, che sembrano vescichette. Moltissime serie di tali cellette, ripiene di bollicine, riscontrai tra li tronchi maggiori de' vasi, anzi ne annoverai più di venti coll'asse un pò inclinato, e colle estremità legate per un filo più grosso. Osservando at-

ten-

tentamente ciascuna bollicella , ravvisai ,² ch' essa occupava spesso più cellette , e , distendendo massimamente nel mezzo li fili , mostrava negli angoli il maggior diametro , e talvolta nel suo mezzo appariva il punto bianco , dond' era uscita . Nella foglia d' aloè retuso , recisa una lamina sottile trasversa , osservai , che la lamina interna della cute pareva formata di cannelli prodotti dall' interno all' esterno , brevi , sottili , che componeano tre , o quattro serie di cellette ; mentre il parenchima verde più interno ne componeva sette , o otto maggiori , che sembravano vescichette . Una lamina dell' aloè , recisa per lungo sottilmente , presentò prima lo strato della cute compatto , bianchiccio , e poi il parenchima celluloso , pieno di bollicelle aeree , pellucide , argentine , di cui ne vidi quattro serie in direzione verticale , quasi tra linee parallele , o appena inclinate le une alle altre , e distinte da fili trasversi . La serie più interna sembrava di minore ampiezza , e più sviluppata dalla sostanza verde . Seguiva di poi la tessitura la più fina , e fissa de' fascetti de' vasi sugosi , bianchicci , connessi , e continui col parenchima verde , posto all' esterno , nè in questa tessitura rinvenni le bollicelle . Lasciando nell' acqua a macerare per poco la foglia , e recidendovi poscia similmente la lamina , li vasi erano più dilatati , e le bolle più grandi , e più mobili , ma in minor numero . Estendendovi la macerazione , s' alterò ogni tessitura , e specialmente nel parenchima , privo di bollicelle così vescifose , e dell' energia stessa contrastile . Da una più lunga macerazione

la

la sostanza verde si disciolse, divenendo gelatinosa, ma ritenendo il color verde all'esterno, e dimostrando sulla sua superficie li corpetti bianchi ovali, e contenendo nell'interno de' granellini rotondi, oscuri, che in gran numero da' mucchi si separavano colla divisione insieme della sostanza bianca, e glurinosa de' vasi sugosi liquefatti; mentre la cute all'intorno restava la più consistente, e quasi coriacea, e pellucida.

Esaminando la figura delle celledette così ampie nell'aloe, e nel bellico di Venere, m'apparvero esagone co' lati disuguali, verdeggianti, e a gruppetti frequenti negli angoli. Il colore del parenchima nelle foglie in sulla faccia superiore si vide più verde intenso, mentre all'inferiore è verdolino, e contiene al di sopra più punti lucidi. Ne' fiori la tessitura del parenchima è più fina, ma simile. Distinguesi nella petala del giglio bianco per la sua grossezza, e bianchezza maggiore, e pegli interstizj, che riempie nella diramazione de' fili laterali, nonchè pel movimento, che hanno le bollicelle di vario diametro nella serie delle celledette comunicanti, principalmente ad una leggera macerazione, per cui esso vi perde la sua bianchezza opaca. Notabile per grossezza, e fermezza si è nelle petale delle altee, e delle malve, e soprattutto alla loro radice, ove si scorge la combinazione di diverse sostanze, e distintamente di tre, cioè dell'esterna, che forma un anello verdolino-gialliccio, della media, che ne forma uno più verde con molte macchie bianche ovali nel mezzo di esso da' pacchetti vascolari, e dell'interna, che

che forma un cilindro di simile sostanza all'esterno, un pò più spongiosa, la quale continova colla lamina bianca interna degli stami, e coll'esterna delle petale, ad angolo curvilineo procedendo. La lamina esterna degli stami sottile appariva verdolina gialletta, consistente, pellucida, dove l'interna ben grossa, e resistente era bianca con fili, e bolle pellucide, e macchie ovali negli angoli, più bianche al contorno. Sembrava ella gelatinosa, essendo però la più robusta, elastica, e flessibile insieme. Anche il pistillo mostrò la sostanza esterna verde-gialletta, e l'interna bianca spongiosa. Nelle petale auree del girasole, e nelle rosse del papavero il parenchima è bianchiccio, sottile, spongioso, frapposto tra le lamine o auree, o rosse de' vasi sugosi. Nel calice del girasole riscontrai le gran cellule; quasi di corpo il più spongioso, per lo più ovali, ed ineguali co' fetti non levigati, ed opachi; le quali verso la superficie superiore apparvero maggiori, e verso l'inferiore minorandosi svaniscono nella sostanza verde, che è sotto la scorza. Questa sostanza verde appare più manifestamente tessuta di fili serpentini con granelli frapposti men coperti, ed involti da' sugosi, sebbene ad essa è continova l'altra, che con cellule molto minori, e rotonde termina all'epidermide. Fra la interna spongiosa, e la verde sostanza si trovano li tubi vascolari, entro a' quali v'ha li fili sottili intralciati, che sembrano diramazioni con diversa direzione, connessione, e diametro, de' quali alcuni seguono l'asse del tubo, che compresso getta un umore dalla

dalla parte loro più gonfia; ove qual varice, o golfo apparisce. Simili tubi con simili fili intralciati si trovarono patenti nelle petale, negli stami, e nel pistillo del giglio, ma senza fili erano comparsi nella foglia del piantaggine. Nè mancano negli stami, e ne' pistilli di altri fiori, come del convolvolo, della vinca, della lobelia, mentre ne' pistilli delle altee, contenuti nel tubo degli stami, l'interna superficie bianca e spongiosa, e l'esterna verdolina. E siccome il parenchima di tutto il fiore delle borragini, e più nelle prominenze esterne unguiformi della corolla, di quel, che nelle interne prismatiche degli stami, molto spongioso, e granelloso egualmente si mostra; così nella petala, e nelle altre parti del fiore degli apocini apparve differente. Quanto più fibroso, e contratto ritrovasi nella corolla della stapelia, che ha la superficie superiore tutta rugosa, di quel, che ne' cornetti, e basi loro, e molto più dello stigma? Nonpertanto, immergendo il fiore tutto intero della stapelia nell'acqua, vidi prima ammolirsi, oscurarsi, e macerarsi la corolla in sulla superficie superiore col suo interno anello, di quel che le parti più interne sessuali. Sebbene ho avvertito, che immersa la sola corolla, distaccata dal calice, e dal pericarpio, più lungamente resistè alla macerazione. Nella macerazione vidi la sostanza verde granellosa non solo ammolita, ma disciolta. Nell'onagra poi il parenchima, e l'epidermide sì delle petale, che degli stami, e del pistillo, e specialmente dello stigma composto, è flaccido molto, e quasi velato di tela di ragno. Il

ca-

calice della granadiglia , che è verde all' esterno , e bianco all' interno , presenta verso la superficie superiore un parenchima il più spongioso, e grosso, e leggero, ed asciutto.

Progredendo variamente il parenchima all' interno , e lateralmente , giugnesi immediatamente al vero sistema composto de' vasi della pianta, de' quali gli esterni più fortili, e più molli, e più pieni di sugo circondano gli interni più fibrosi, e più larghi, apparentemente o vuoti, o pieni di aria. E quelli e questi sono disposti in fascetti, o pachetti di diversa grossezza, e figura, e v'ha pure in quelli dello stesso genere diverso diametro. La diversa estensione, ed angustia de' primi in piani diversi col parenchima formano la sostanza del libro in istrati più, e meno compatti nelle parti fresche, e secche delle piante; siccome il composto de' primi, e de' secondi co' setti laterali formano la sostanza del legno, sì robusto ne' tronchi, e rami degli alberi, e sì molle nel fusto di tante erbe, e sì diverso nel peduncolo, nelle coste delle foglie, e delle corolle, sebbene in ciascuna parte il più consistente rispetto ad altra sostanza.

Il doppio sistema de' vasi io lo trovai diversamente disposto nell' interno delle piante giusta le sezioni, che feci per piani orizzontali, o trasversi, e per li verticali, o longitudinali della pianta. Recidendo alcune lamine attraverso da' tronchi, da' rami, da' picciuoli, da' pedicelli, dalle coste delle foglie, e delle petale, osservai le diverse macchie in grandezza, figura, e colore, collocate tra la scorza, e la midolla della pianta,

B

e di-

è distribuite a varj intervalli all'intorno . Esaminando le stesse a lume riflesso , e trasmesso vidi , che esse appa-
 riscono di diverso colore , e di diversa sostanza . La
 parte media vascolare della macchia a lume riflesso ap-
 par bianchiccia , scabra per lo più , e la parte all' in-
 torno più ampia all' esterno ; che all' interno , e molto
 più che a' lati sembra verdolina levigata ; laddove la
 prima a lume trasmesso suol essere bianca ; è la secon-
 da verdicea . Questa si trova pertugiata molto più dell'
 altra , avendo insieme li fori un molto maggior diame-
 tro ; sicchè ho potuto non di rado annoverarli . Ho pe-
 rò rimarcato , che ad una tal sezione l' area interna de'
 fori maggiori si sollevava , mentre l' altra esterna piut-
 tosto abbassavasi ; restringendosi ambedue . Le due so-
 stanze pertugiate formano insieme li pacchetti vascolari
 composti ; o gli ammassi cilindrici , semicilindrici ; pira-
 midali ; parallelepidi , o d' altra figura ; che si trovano
 nelle diverse spezie di piante , e nelle diverse parti del-
 la stessa spezie . Questi pacchetti meglio si esaminarono
 colle sezioni delle lamine per lungo , e che passavano ,
 radendo la loro circonferenza , o secondo il loro asse .
 In quelle per l' asse ho potuto vedere la maggior lar-
 ghezza di tutto il pacchetto , e delle parti sue diverse ,
 segnando anche il confine de' vasi medj più grossi . Nel-
 le altre lamine , recise per li piani tangenti la loro su-
 perficie , o distaccati altramente con esattezza dal pa-
 renchima , ho distinta la particolare loro struttura nelle
 diverse piante , e nelle parti differenti della pianta ; e
 compresi , che li vasi centrali del pacchetto generalmen-
 te

te sono le trachee così dette ; fabbricate di fili rivolti a coclea, come quello di ferro ne' cavastracci ; connessi però esattamente , e composti ciascuno di più fili ritorti, qual funicolo ; il che riconobbi, inflettendo, e semirompendo il pacchetto sì unito all'altra sostanza, come separato. Li vasi poi esterni del pacchetto più sottili, e più copiosi verso la scorza sono li vasi sugosi. Questa unione, e relazione del doppio sistema vascolare ho riscontrata non solo nel fico, e nel pero tra gli alberi, nella fitolacca, e nel leandro tra gli arborescelli, ma nell'erbe in gran numero, cioè ne' picciuoli, e nelle foglie non solo del lapazio, del rafano rusticano, del blito, del papavero, della borragine, e di altri, ove è più manifesta ; ma eziandio nelle foglie crasse, e carnose della porcellana, del semprevivo, del cotiledone, dell'aloè, nonchè in quelle dell'iride, della corona imperiale, del giglio, della canna. Nè si rese punto oscura una tal tessitura ne' calici, nelle petale, negli stami, e ne' pistilli de' fiori. Le coste medie, e laterali della foglia, e delle petale, per quanto si ramifichino diversamente, constano d'un tal pacchetto composto, che va in progresso minorando di diametro, e divenendo pellucido nella parte esterna, qual si scorge nelle stesse petale de' fiori. Le coste medie delle petale dorate del girasole, mentre mostrano la loro pellucidità all'intorno, lasciano vedere nell'asse il filo, o pacchetto opaco ; le quali attraverso recise tramandano un li-core pellucido dalla loro sezione.

Dal picciuolo della foglia del rafano rusticano levai

Un pacchetto cilindrico di part. 3. nel diametro , la cui area circolare dimostrò quaranta forellini di quaranta tubetti diversi di lume , che a certa distanza soltanto discernevanfi. Nel mezzo vi erano de' forellini minutissimi, quai punti bianchi sparsi in sostanza gialletta verdolina, e molti fili spirali si svilupparono con lanugine finissima loro aderente , opaca ad ogni lume , e con setti pur verdolini tra' tubetti. Nel peduncolo della foglia del fico recisa la scorza , mercè l'inflessione ho potuto svogliere così bene li fili spirali da' pacchetti tracheali, paralleli, argentei, che dodici fili restarono sviluppati ed annessi ancora colle loro estremità , li quali a maggior inflessione del picciuolo si distraevano , allontanandosi le loro spire ; quando, minorata la stessa, s'avvicinavano, e divenivano quasi tubetti. Ineguali erano li fili nella superficie, non affatto cilindrici e pellucidi, per le particelle de' setti lanuginose distaccate, e rimaste. Grossi più e meno sogliono essere gli stessi fili , perchè composti di diverso numero di filetti ritorti . Ho potuto, piegando similmente la costa della foglia del giglio bianco, che era stato un pò immersa nell' inchiostro , vedere disciolto il filo torto in più filetti , sicchè sei ne ho annoverati. Qualuno de' filetti si rompe, e qualche altro si svolse molto , separandosi dalla sostanza vascolare sugosa macerata ; e vi notai qualche filo congiunto al parenchima ; la qual unione nell' aloè si è meglio rilevata.

Indagando la connessione del pacchetto spirale centrale col sugoso, ho potuto nelle lamine sottili , e nel
pac-

pachetto intero, levato dal picciuolo della celidonia scorgere la relazione de' vasi spirali bianchi giallognoli a' sugosi dorati, o gialli. In questo vi osservai tre sostanze, cioè un pacchetto centrale, composto di tubetti cilindrici spirali, avvinti insieme strettamente, un altro alla circonferenza di vasetti aurei oscuri, meno retti, più sottili, non contigui, quasi composti di vescichette unite insieme; o di pezzi cilindrici, ed indi un medio anello, composto di tubetti gialletti, più e meno contigui, e più e meno fini, sembrando più sottili, e più contigui li più vicini al pacchetto centrale, e più grossi gli esterni confinanti col parenchima; anzi nel confine compariva un orlo più verde, quasi un vaso. Sono uniti li tubetti colorati più manifestamente da una serie di fili trasversi, li quali comparivano pur tinti di colore, quando il dorato degli altri era il più intenso. Tra' fili trasversi, o vasettini colorati vi erano frapposte qua e là delle bollicelle rotonde, ovali, talvolta compresse; e tutta la fascia bianca esterna sugosa era ingiallita, e mostrava sì li vasi grossi per lungo, come li trasversi tenuissimi con alcune dilatazioni maggiori, e più colorate. Quindi conobbi le anastomosi vascolari pe' vasettini trasversi. Ho avvertito però in tali osservazioni, che il colore ne' vasi sugosi si cangia, standosi all'aria il pacchetto, passando dall' aureo al giallo, al gialletto, al verdolino, al verde, al bianco, mentre par, che gli spirali si colorino via più, specialmente all'estremità, o alla sezione.

Premendo tutto il pacchetto vascolare, dalle sezioni;

aperte de' vasi sugosi usciva il fluido giallo, e da quelle delle spirali alcune bollicelle acqueo-aeree. Siccome poi ne' vasi sugosi vedeva il fluido più, e meno colorato; così ne' vasi spirali erano evidenti le colonne di fluido acqueo-aereo, che ora empiva il lume del tubetto interamente, ed ora interrottamente sì, che in qualche sito il parete era pellucido, in qualche altro di color argenteo, e dove gialliccio, e dove aureo-bruno, e dove con punti gialli frapposti tra le colonnette argentee. Quindi compresi, che ne' tubetti spirali non solo vi è all'aria aggiunto altro fluido, ma che questo ha qualche grado del color sugoso della pianta. Colla stessa pressione raccolsi, che se pellucido faceasi il tubetto, ove mancava il fluido, diveniva tosto argenteo opaco al raccorsi del fluido nel luogo vuoto. Ho notato inappresso, che dalla compressione talvolta la colonna del fluido non muovevasi, e talvolta rapidamente scorreva, ed uscivano per la sezione le bollicelle, rompendosi tosto, e talvolta si divideva in molte parti interrotte, come fa la colonna del mercurio nel barometro, che si getta in molzi pezzi, più e meno globosi, qualora dell'aria intermedia vi entri, o si sviluppi. Li fili trasversali del pacchetto sugosi erano più manifesti, che quelli del tracheale, anzi, mostrando una figura conica in più luoghi, sembravano quasi glandulari. Da tal osservazione cominciai a conoscere non solo la differenza de' tronchi vascolari, ma anche la comunicazione tra quelli d'un genere con quelli dell'altro, e tra quelli eziandio del medesimo genere.

Ri-

Rinovando le sezioni trasverse , vidi l'umor sortir da' lumi de' vasi sugosi a gocciolate sulla superficie , dove più , e dove meno aureo , o giallo , ma non furono sì tinte le bollicelle uscenti a gran pena da' lumi delli vasi tracheali . Forse ciò deriva dalla contrazione , che tosto nasce in questo genere di vasi nel luogo della sezione , che sminuisce li lumi , o dall' aria esterna , che vi si oppone ? Vidi inappresso , che li stessi vasi sugosi in progresso mandano fuori un umore men colorito , acquoso , e finalmente mescolato con bollicelle aeree ; specialmente dopo un qualche grado di macerazione ; ed allora vedeva più spedito il moto delle bollicelle acquose aeree negli stessi tubetti tracheali in molte piante , e distintamente nella porcellana , nel rafano rusticano , nel lapazio .

Levaro un pacchetto composto dal fusto della porcellana , cilindrico , qual era , distinsi quindici , o sedici tubetti rettilinei , gonfi , pieni di fluido , argenteo a lume riflesso , de' quali alcuni divergendo diramavansi . Premendo colle dita ascendeva il fluido a varj intervalli , e lasciava vuoti , e pellucidi certi segmenti vascolari ; anzi in due tubetti contigui ascendendo il fluido passava dall' uno nell' altro . Levatoci appena un altro fascetto , distendendolo vidi , che non solo si raccorcia per se stesso , ma insieme si strigne , e s' indura , restandovi il fluido imprigionato , il che molto più si confermò nel rafano rusticano . Quivi si trovano notabili anche le fibre legnose , le quali rompendosi non danno fili spirali , ma cilindrici , e sono unite co' fili trasversi ,

che sono opachi, nè tanto sottili, nè regolari, sebbene difficilmente discernonsi per la densa tessitura. Nella grossezza di part. 1. ho potuto numerare più di 50. filletti, ed esaminarne uno d' una quarantesima parte, pellucido, solitario, che mi fece conoscere, che li fili oscuri erano o li composti, o quelli, che contenevano del fluido.

Nel picciuolo della foglia del lapazio trovando li due fascetti concentrici, e composti ciascuno de' loro tubetti, osservai tra l' uno, e l' altro una fascetta verdolina pellucida, la cui fina tessitura sfuggiva, sebbene alcuni granellini apparivano sparsi, la quale serviva di connessione maggiore al pacchetto interno, o a' vasi spirali. Una lamina trasversa dell' intero pacchetto, osservata a lume riflesso dimostrava solo la densità, e il color verdolino de' vasi sugosi maggiore all' interno, che all' esterno; laddove risguardata a lume trasmesso del Sole cadente, oltre la più fina tessitura di fili rettilinei, fece vedere alcuni lumi aperti, pellucidi, ed alcuni altri pieni, ed oscuri con setti, o granelli trasparenti, appena discernibili a tal lume trasmesso. Separando poi il pacchetto cilindrico interno dall' anello sugoso esterno, rilevai la coerenza, che hanno li più interni tubetti, e li setti verdolini colla sostanza bianca.

Nel piantaggine il fascetto composto facilmente si estrae dal condotto, o vagina, in cui si contiene sì del peduncolo, che delle coste, e nell' estrarsi presenta la sua robustezza, ed insieme quasi la doppia distensione, di cui è suscettibile. Estratto all' esame dimostra la
com-

combinazione de' tubetti tracheali co' sugosi in guisa , che quelli risguardano la superfizie superiore , o interna , e questi l' inferiore , o esterna , distinguendosi questi dalla sostanza bianchiccia a lume riflesso , o verde oscura a trasmesso , e quelli dalla scabra , e prominente superfizie , e da' filetti spirali , che in parte vi restano sviluppati , ed ondegianti .

Nel tronco , ne' rami , e nel picciuolo del leandro il pacchetto vascolare colle sezioni trasverse dimostra non solo la diversa configurazione , che egli ha relativa , ma eziandio la molto diversa sostanza , e colore , che porta il doppio sistema di vasi . Quivi gli spirali sembrano inflessi , o cortugati nel loro fascetto , e li sugosi con diversa direzione distribuiti ; sebbene questi sempre all'intorno di quelli , e separati ; e secandosi vengono sempre più oscuri sì a lume riflesso , che a trasmesso . Negli stami incurvati della parietaria , e dell'ortica li fili spirali sono sì diramati , che nella flessione pajono annulari ad un tratto , mentre la loro distribuzione è tale , che sembrano contenere la più opportuna meccanica ad elastico per rendere questo , a certo grado di forza pervenuto , il più atto alla più rapida azione nel suo dilatarsi , raddrizzando lo stame , rompendo l' antera , ed aggrinzando gli involucri , rivolti all' asse del fiore , e determinando finalmente ad incurvarsi gli stami all' opposto . La corolla più campaniforme , che infundibuliforme della mimosa sensitiva , secandosi s' aggrinza , e mostra non solo la sua tessitura retiforme di fibre serpentine , ma anche li fili vascolari
oscuri

oscuri tracheali con diramazione manifesta . Essendo ciascuno de' quattro, o cinque stami, sette, o otto volte maggiore in lunghezza della corolla , vi stanno in essa rannicchiati, compressi, ed attorcigliati, finchè si apre; ed aprendosi essa artificiosamente , si veggono gli stessi saltar fuori con forza , ed allungarsi , ma non retta- mente . Ciò deriva da' pacchetti spirali, che si espan- dono , e che si veggono co' peluzzi , e filetti spiral- mente disposti negli stessi stami secchi, nonchè ne' ma- cerati, disciolti in fili lunghissimi, e sottilissimi. Nelle altre parti ancora la sensitiva mostra sotto la cute li molti pacchetti argentei, più e meno tuberosi , e li tubetti spirali, e serpentine, ma più sciolti negli inter- nodj, e meno circondati da altra sostanza, onde essi in gran parte legano le foveette bislunghe , laterali, ante- riori dell'articolazione de' rami, e de' picciuoli; donde io derivai la meccanica del moto della sensitiva . Tagliando una lamina sottile dell'internodio osservai l'anello medio di vasi spirali notabile, composto di due serie ovali, o quasi semilunari colla faccia più convessa rivolta in alto, e colla concava, o meno convessa, ab- basso, e coll'estremità a' lati dell'internodio . Lascian- do un po' asciugare l'internodio, l'anello vascolare spi- rale si restringe , e sporgeva all'insuori dalla media su- perficie, circondato da sostanza più verde, e pellucida. Tagliata una lamina dell'internodi per l'asse , vidi li pacchetti longitudinali convergenti , ed assai grossi ri- spetto all'altra sostanza del parenchima verde spongio- so . Distinse evidentemente il cammino spirale de' fili
per

per una tale sezione , lasciando intatto tutto l' intero fascetto , che mi parve rilassato , quasi li fili rotti del bombace .

Proseguendo le ricerche de' pacchetti vascolari ne' rammi degli alberi , ho recisa una lamina trasversa d' un rametto di fico alla parte superiore , ove già la scorza verde era fatta bruna , e riscontrai nella scorza molti anelli a lume riflesso , cioè il primo il più interno a piccolissime frangie bianche , eminenti ; il seguente verdastro con setti bianchi trasversi , e con filo intermedio , che gli unisce circolarmente ; indi un esterno di pacchetti vascolari tracheali con eminenze ; e finalmente il più esterno oscuro . Laddove in una parte più inferiore del rametto , ove bianca nell' asse è la midolla , v' ha a questa contiguo un anello verdastro , gialliccio e scabro , che nel lembo interno presenta una fascetta bianca , ed all' esterno vi segue un' altra più larga , cioè un anello bianco il più largo , che manda de' setti simili alle frangie , legando la corteccia col corpo legnoso . Anche il verdastro interno produce de' setti , o raggi verdolini verso all' esterno . Questi anelli nel confine di separazione sono più prominenti , e più oscuri , come sono li setti , o li raggi , che gli intersecano attraversando dal centro alla circonferenza ; dal che conobbi , che li pacchetti vascolari sono in varj modi dall' interno all' esterno distribuiti , oltre a quelli , che si trovano dispersi presentando varj fori . Una lamina simile , recisa dalla parte più superiore del rametto ancor verde e molle , nel penultimo nodo diede appena segno di midolla
bianca

bianca nell' asse , ma all' intorno vi era un anello pel-
lucido , spongioso , ben largo , alla parte esterna cir-
condato da un altro bianchiccio , o verde-giallo , di-
verso di colore a lume riflesso , e trasmesso . Seguivano
un altro a frangie , quasi di pezzi ovali contigui , e le-
gati con filo intermedio , che era attorniato da altro
spongioso , dopo cui indistinti erano gli altri della scor-
za , divisi da' fili radiali , onde all' interno appariva il
bianchiccio , ed all' esterno il bruno . Il picciuolo della
foglia del fico mostrando la sostanza centrale bianchic-
cia , sugosa , spongiosa , indi le macchie verdi nel mez-
zo , e biancastre all' intorno , con sostanza spongiosa
nell' anello esterno , presentò la tessitura del parenchi-
ma , e de' pacchetti vascolari differente . E veggendo
in tanti anelli bianchi distribuita la sostanza de' vasi su-
gosi in tanto numero , e tra tanti altri tracheali , non
mi maravigliai dell' uscita di tanto sugo lattiginoso da
ogni parte della recente sezione de' rametti , e pedun-
coli di questo albero :

: Recisa similmente una lamina della foglia lunga dell'
aloe viscoso , apparvero le macchie de' pacchetti vaso-
lari verso la circonferenza in gran numero , e molto vi-
cine , sicchè ne annoverai fin 25. dall' una , e quasi
altrettante dall' altra faccia della foglia ; delle quali al-
cune erano contigue , altre connesse per brevissimi fili
della stessa loro qualità . Le sezioni di queste macchie
fatte pel lungo della foglia , mostrando li pacchetti di-
visi , fecero conoscere la mollezza di questi , e la riso-
luzione , e ramificazione ne' fili sì obliqui , ascendenti , e
discen-

discendenti, come ne' diretti orizzontali, che unendosi vicinamente formano le aree esagona, che hanno li lati diversi in lunghezza, ma simili in pellucidità, e gli angoli tubercolosi, argentei a riflesso, ed oscuri a lume trasmesso. Osservando esattamente il sito, e il modo delle divisioni, e ramificazioni de' pachetti, raccolti, che un tubo del pacchetto vascolare si dividea prima in due rami ad angolo un pò minore d'un retto, ed ogni ramo similmente si suddivideva, e dal loro concorso formavansi de' tubercoli con figura di trombette ben grosse, ed argentine a luce riflessa, oscure a trasmessa, più frequenti in principio, che in progresso della divisione. Anzi notai bene, che le aree dal pacchetto verso il mezzo della foglia givano sempre crescendo di ampiezza, e li fili decrescendo di diametro; sicchè verso il mezzo la tessitura retiforme in questa foglia era la più rara, e la più fina.

In altra foglia d' aloè più larga, e più robusta, che mostrava in tutto il contorno più di 100. pachetti vascolari, dimostrò anche nel mezzo un fascetto bianchiccio, un pò più molle degli altri. E veggendo ne' primi fascetti diversa pellucidità, per mezzo della compassione distinsi le bollicelle del fluido contenuto ne' loro tubetti, che in qualche sito si muoveano, ed in altro immobili restavano, mentre altre respinte per poco ritornavano indietro al sito primiero. Quivi li pachetti non mostravansi affatto cilindrici, e rettilinei, avendo li setti trasversi, o li rami laterali, composti de' fili della sostanza sugosa, e tracheale; li quali per la pel-
lu-

lucidità dell'umore catenutovi sembravano indistinti , & appena distinti ne' tubercoli degli angoli . Dall' unione di questi fili , o vassellini di diverso genere nasceva la tessitura interna tetiforme della foglia dell' aloè con' fili, che , formando le aree , descrivono piani inclinati per ogni parte ; mentre il pacchetto intermedio ascende rettammente , e verticalmente . Ho molto rimarcata questa direzione de' rami vascolari per piani sempre più inclinati , considerando così il moto più facile , che aver deve il fluido ne' tubetti contenuto .

Il sistema vascolare mi parve particolarmente distribuito nelle parti del fiore delle piante . Facendo una sezione trasversa del pedicello del papavero un pò sotto del calice , trovai due serie di pacchetti vascolari nell' area , l' una concentrica all' altra , o l' una più all' interno dell' altra . Fatta poi tal sezione trasversa del peduncolo , distante dal calice part. 3 , che chiudeva per ancora la corolla , trovai circa l' asse un' area verde piccolissima con de' tubercoletti all' esterno ancor più verdi , tra' quali vi erano li primi pacchetti vascolari , che a lume riflesso erano bianchicci ; mentre a trasmesso il loro contorno quasi triangolare appariva rossigno , come lo era l' area interna degli stessi pacchetti . Fatta un' altra sezione trasversa pel piano , che passa per la radice del calice , rimarcai una diramazione de' pacchetti , che s' erano ammassati all' asse , e lasciavano appena veder vestigio di area verde , in modo , che sembravano li rami venire a guisa di raggi dal centro alla circonferenza . Questi pure a lume riflesso compariscono bianchicci

chicci con fili misti rossigni , e con un anello esser-
no colorato , mentre a lume trasmesso si scorgono
inoltre quattro setti verdi in croce , dall' area centrale
alla circonferenza prodotti , ed un filo colorato , che divi-
de li pacchetti nel mezzo . Dall' anello interno pure partono
de' fili , quai raggi colorati , che vengono ad entrar nel-
le petale . Bello è il vederli all' ingresso , ove sembrano
connessi per un filo circolare colorato , che forma la co-
municazione comune tra loro verso la circonferenza dell'
area , prima che giungere alla radice delle petale !

Lasciando in questa sezione il calice congiunto con
essa ; riscontrai li setti verdi prodotti dal centro alla
circonferenza senza esser continui colla sostanza verde
della scorza del calice ; mentre vi era un anello bian-
chiccio-gialletto di separazione , fatto già dalla lamina
fugosa . Vidi però la continuazione de' vasi del calice
risguardando dalla superficie interna della sezione , e
della foglia del calice congiunta . Questi vasetti , che
intersecano a foggia di raggi l' anello bianco , prove-
nendo dalla parte centrale , dimostrano nell' asse un filo
colorato , di cui ne ho contati diciotto esattamente .

Tagliata una lamina per un piano tra la radice delle
petale , e il terminé degli stami ad essa congiunti , trovai
l' area centrale men verde , maggiore di ampiezza co-
pacchetti esterni , segnati tanto nell' interno , quanto
nell' esterno contorno di fili colorati . Dall' esterna su-
perficie sì dell' orlo interno , che dell' esterno continua-
vano li fili a raggi , passando negli stami , nè discernevanli
questi , dall' interna superficie risguardando , nell' anello

Vet-

verdolino esterno, ma solo nel bianco seguente , e più esterno,

Recisa finalmente una lamina tra il termine degli stami, e li setti del pericarpio, trovossi l'area centrale più verde co' pachetti divisi nel contorno dell'area de' setti verdi radiali, che dall'area interna venivano alla scorza del pericarpio. Notai nel mezzo de' pachetti bianchicci spirali il filo, che li divideano non più circolarmente, ma longitudinalmente dall'interno all'esterno, come da altro raggiolino colorato; li quali fili entravano nella radice de' setti, venendo poi allo stigma. Altre sezioni molte consimili io feci a calice aperto, e corolla sbocciata colle petale ancora aderenti, e rinvenni simile disposizione di fascetti, e di fili colorati in mezzo loro, diretti alle petale, agli stami, al pericarpio, al pistillo.

Eseguita una sezione lungo l'asse del peduncolo e della corolla, tagliai una lamina sottile, e osservando alla regione del calice la diramazione del pacchetto vascolare, notai l'ingrossamento, e l'anastomosi de' fili vascolari nel sito della divisione, comparendovi a lume trasmesso il color rosso oscuro. Nell'asse di alcuni vasi bianchicci de' fascetti distingueva li fili rossi, che poi si produceano nelle petale, e negli stami, e in altre parti; e così ravvisai la doppia serie de' pachetti vascolari, e la anastomosi loro colla continuazione de' pachetti de' vasi esterni cogli interni, nonchè cogli intermedj, siccome apparve l'origine interno de' fili colorati, e la loro distribuzione diversa all'in-
tor-

torno, ed a raggi. Si riconobbe inoltre la comunicazione della scorza colla parte centrale del peduncolo, e del pericarpio, onde il calice non parve la sola corroborazione della scorza, diramandosi per esso pure li Pachetti medj vascolari. Colle sezioni particolari del peduncolo del calice, e della corolla della stapelia, dell'apocino, dell'asclepiade, della periploca ho effese le ricerche analitiche dell'organizzazione vascolare, ed insieme determinati gli organi diversi sessuali della famiglia degli apocini.

Tagliando una lamina del peduncolo attraverso presso il calice, riguardai a lume riflesso le macchiette bianche de' pachetti vascolari in un anello quasi continuo, che a lume trasmesso era verde nel mezzo, compreso da un'area bianca lattiginosa, che svariava gradatamente sì verso la scorza, che verso la midolla; sebbene la sostanza sembrava uniforme con vesiche altre pellucide, ed altre opache, e quelle piene di umor acquoso, e quelle di vapore aereo. Il calice robusto, che restringendosi si fa campaniforme, e si distacca dalla corolla, indica l'energia, e la contrazione de' suoi pachetti vascolari; dalli quali derivano le rughe della corolla principalmente. Questi pachetti sotto la corolla dimostrano li loro tronchetti chiaramente, e nella corolla, e nelle ale degli anteri la loro diramazione. Quanto son manifesti li tronchetti de' vasi composti anche nelle parti sopra il calice dell'asclepiade, dell'apocino, della periploca, e quanto vaga la diramazione de' fili maggiori nelle ale degli anteri, e de' minimi

C

nelle

nelle vessichette pellucide, e ne' corpetti neri, nonchè nello stigma?

Il fior della granadiglia alla particolare struttura esterna vi unisce l'interna distinta. Il calice nella parte verde esterna più espansa della bianca interna, presenta una tessitura di pacchetti vascolari, che s'anastomizzano, nel cui asse mostrano il filo, o fascetto verde-oscuro de' vasi tracheali, attorniato dall'anello verdolino pellucido de' vasi sugosi. Li cinque stami larghi, qual fascetta principalmente in alto, unendosi nel mezzo, e formando quasi un tubo cilindrico, mostrano nella grossezza di questo pria un anello, la cui larghezza reca tre fili verdi oscuri, che continuano nel parete del pericarpio, e poscia un altro esterno nella grossezza del cilindro, che porta li pacchetti vascolari alle fascette degli stami disgiunte. La più fina tessitura reticolata de' pacchetti vascolari si è quella della lamina degli anteri, che, dalla posizione verticale passando all'orizzontale, vengono ad abbracciare gli stigmi de' pistilli incurvati, e ritengono un moto il più facile per ogni verso; e poi si raggrinzano, e s'abbreviano.

Tagliando attraverso dal calice in sù della granadiglia una lamina sottile, osservai l'anello esterno verdastro con qualche macchietta bianca de' pacchetti vascolari, poscia una sostanza bianca spongiosa, indi l'anello primo medio con undici macchie, ed il seguente interno con cinque altre maggiori ineguali, poi l'ultimo il più interno con maggior numero, e più unite. Tutte eran bianche d'intorno a lumé trasmesso,
e con

è verdoline oscure nel mezzo. Laddove rinvenni nella superiore seconda lamina il primo anello con macchie grandi separate, bislunghe, semilunari, indi un altro con fascette radiali dall' esterno all' interno. Nella terza lamina vi era la circonferenza dentata pellucida, poscia un anello simile bianco-pellucido, ed una serie circolare di macchiette violacee all' esterno con altro anello, e cinque macchie maggiori rotonde, e con macchietta oscura in mezzo a lume trasmesso, che convergono in progresso; mentre le macchiette d' altro anello interno si facevano più regolari verso il fine del cilindro degli stami. Ho poi ravvisato, che li pacchetti delle cinque macchie esterne vanno a cinque fili degli stami. L' anello interno del pistillo ha le macchie esterne disgiunte, ed al fine sembrano radiali, e rotonde con altre in mezzo centrali.

Nella maraviglia, ove gli stami, ed il pistillo molto più lunghi della corolla, ed attorcigliati, fatta una sezione per l' asse del fiore, rimarcai l' anello de' pacchetti vascolari del calice all' esterno, e l' altro per la corolla, e gli stami all' interno. Ammirai la contrattilità delle parti di questo fiore, che tenuto brevemente in mano al calore chiudeva la corolla.

Nel blito, risolvendo li mucchietti della parte maschile, e delle tre femminine unite con peduncolo comune, a lume trasmesso osservai tre fili verdi, che all' unione de' peduncoli proprj, e del fondo della parte maschile si uniscono tra loro evidentemente, e poi si dispergono nelle parti diverse del fiore. Anche il calice, o corolla maschile, in mezzo verdolina secondo la

lunghezza fino all'apice delle cinque foglie , o petale , e a' lati bianchiccia , pellucida , reticolata nella superficie interna concava presentava li più bei fili bianchicci , o pacchetti vascolari . Notai il breve , e facile appassimento de' cinque stami , mentre tutti due li calici , e le corolle femminili , congiunte colla maschile in un peduncolo comune , e poste a' lati , e molto più la terza senza peduncolo particolare , opposta alla maschile intermedia , si serbano , e mostrano l'imbuto aggrinzato co' tre fili nel vertice angusto del pistillo .

In un' altra specie di amaranto cruento osservai , che , sebbene la capsula del pericarpio con sei semi si apra in due emisferi superiore , ed inferiore , e che il superiore , in cui s' allarga il pistillo , divenga più aggrinzato , e più rosso anche nel suo orlo di separazione , nonpertanto li pacchetti vascolari rossigni ascendenti continuavano dall' uno all' altro emisfero , finchè il fiore è recente . La parte poi esterna , o la lamina de' cinque stami unita alla corolla dimostrò , che il colore de' quattro suoi pacchetti passava dal rosso al bianco , mentre quello de' simili di alcune petale fin dappprincipio era vario , cioè bianco in mezzo , e rosso intenso nel fine .

L' analisi particolare , ch' io feci del bliro , mi fece conoscere e contemplare la gran provvidenza dell' Autore della Natura . Poichè , essendo quivi le parti della fruttificazione sì numerose , ed abbisognando di tanti vasellini da dispergersi in tante particelle del calice , o della corolla , e degli stami , e de' pistilli , e del pericarpio ; si è provvisto anche d' un grandissimo numero di

pa-

pacchetti nella parte più interna del fusto della pianta, oltre le anastomosi ne' peduncoli comuni, ed un numero immenso di stigini legittimi in sulla superficie nell'epidermide.

La midolla, che, qual parte cellulosa generalmente viene considerata; men sugosa, più bianca, e più leggera, ad un esteso esame in più piante, è ad un retto confronto, presentò molte differenze. Nel picciuolo della foglia del fico; e nel nodo penultimo del ramo, è sugosa, giallo-verdolina, e poco appresso al di sotto comincia ad essere bianca, e secca, avendo all'intorno l'anello verde, e così discendendo vi cresce nelle parti più inferiori, occupando l'asse del ramo.

Nel picciuolo della foglia del girasole; si vedono in un'area sugosa verdolina alcune macchie bianche, e secche, quasi midollari, che progrediscono fin nella costa della foglia per qualche tratto, e poi svaniscono, restandoci la macchie verdi prime.

Nel fusto della fitolacca la midolla è particolare a lamine quasi orizzontali, separate tra loro per ispazi vacui. Ogni lamina è secca, elastica, resa, e più grossa nel contorno esterno, che in mezzo, ed ha la superficie superiore concava, verso l'asse pellucida. L'area dell'anello celluloso, confinante all'esterno, è verdiccio pellucido, nel quale moltissime macchie, di tessitura simile alla midollare, ben piccole, ma distinte ad occhio nudo, quali punti bianchi, apparvero. A lume trasmesso un po' obliquamente la tessitura di tutta la sostanza dell'anello, e della midolla rendevasi pellucida, vesicosa, e sparsa

e sparfa di macchiette più e meno oscure . La media vera della midolla sembrava meno pellucida , e le macchiette disperse tra la midolla , e la scorza erano oscure . Annotai qui pure , che le cellule apparenti erano un intreccio de' fili di diversa lunghezza , e grossezza tessuti in aree , ed in piani diversi , sicchè le molte aree contenute nella grossezza della lamina recisa , così intrecciate formavano le cellule stesse . Ma ho avvertito insieme , che molto più fina è la tessitura delle cellule della midolla , sebbene le aree sembrano maggiori , e che li fili più grossetti per li diversi pelluzzini lanosi , come se fossero li fili torti de' vasi tracheali disciolti , e attorcigliati . E questa sostanza lanosa , elastica era più evidente nella midolla di questa pianta ; dove presentandovisi una qualche simiglianza de' corpetti bianchi sotto l'epidermide , parve di poter dedurre , che una tal tessitura dell'una , e degli altri deriva da una risoluzione de' fili composti , e contorti de' vasi spirali . Osservando lungamente , ed attentamente a lume trasmesso le lamine della medesima midolla , ho avvertito , che , stando esse all'aria , andavano presentando de' colori diversi dall' esterno all' interno di varia qualità , ed intensione , ma per lo più misti , cioè il vinoso diluto , il verdolino gialliccio , il roseo languido , il celeste diluto per tal serie , che questo per lo più era centrale , e talvolta anche il vinoso . Inoltre a' raggi riflessi del Sole alcuni colori apparivano su tali lamine varianti , come sulle bolle di sapone ; il che non vidi giammai sulla sostanza cellulosa del parenchima , e sulle mac-

macchie bianche disperse qua e là nel medesimo , le quali a lume trasmesso conservavansi affatto opache oscure. Questi colori però non comparvero nella midolla di tal piastra nel tempo del verno in istato di qualche disseccamento , e macerazione. Facendovi alcune sezioni trasverse orizzontali nel fusto di essa , le cellule della bianca midolla m' apparvero più eminenti , quasi vescichette piene d' aria , e più convesse di quelle dell'anello esterno celluloso bianco-gialliccio . Premendo colle dita tutto il corpo del fusto troncato , e molle , ed osservando gli innumerabili globetti , simili a' mercuriali , uscire da' pacchetti vascolari del corpo legnoso , e svilupparsi alcune bolle maggiori dalla sostanza stessa dell'anello celluloso , non ho potuto scoprire , che simili bolle uscissero dalla midolla , benchè un pò molle . Dalle sezioni più longitudinali in tale occasione ho ravvisato li moltissimi tubetti vascolari , ben lucidi , quasi fili d' argento , secondo la lunghezza della scorza con molte macchie ben ampie , e biancastre ; e li molti pacchetti vascolari spirali secondo la lunghezza della parte legnosa . Avendovisi in tal caso la più facile separazione della sostanza de' pacchetti sugosi dall'anello interno celluloso , vi si ebbe lo sviluppo di moltissimi fili spirali da' tubetti de' fascetti della parte legnosa , li quali fili si vedevano a spire , più e meno distese , connessi , ed immersi nella parte cellulosa ; mentre alcuni più sottili si potertero discernere alla superficie della midolla . Da una tal macerazione si ebbe a comprendere la vera continuazione de' fili dell'anello celluloso ne' fili della mi-

dolla, e ad annotare, che in questa v'ha una maggior loro risoluzione con maggior sottigliezza, e minor torcimento, a più frequenti anastomosi corrispondendo più aree di numero, ma minori in ampiezza; le quali ritengono nella divisione particolare in fili più e meno orizzontali la tessitura retiforme ad aree esagone, dal fluido sugo meno riempiti, e forse dall'aereo più sottile inaffiati, ed animati.

Una tessitura cellulosa ad aree simili più fine rinvenni eziandio nella parte media midollare della foglia dell'aloè, ove non è secca, ma da viscido sugo umetrata. E quivi, annotate le diramazioni de' pachetti vascolari nel corpo celluloso, che vi ha all'esterno, ed all'interno, riscontrai, che li rami all'interno, risolvendosi in fili inclinati coll'angolo rivolto verso l'asse della foglia, vanno continuando per innumerabili anastomosi; ed aree con diversa inclinazione verso l'asse, ma sempre più sottili. Quindi; recisa una lamina sottile per l'asse di tal foglia, ho veduto la lamina esposta all'aria aggringarzi nelle aree, e a farsi più sottile nel mezzo, e nello stesso tempo a restringersi tutta in larghezza. E, quantunque le bollicelle aereo-acquose predominino nelle cellule del parenchima, fraposto tra la cute, e li pachetti vascolari; nondimeno nelle aree anche interne tra' fili li più tenui vene erano alcune, ove pur qualche filo era più gonfio, e vi avea nelle loro connessioni angolari de' tubercoli ancor maggiori, ed oscuri. Ma quello, che osservai nella parte media midollare dell'aloè, particolarmente a raggi

raggi del Sole trasmessi, sono certe moleculè ovali, quasi gelatinose, che ascendevano, e discendevano, e giravano per ogni verso, risalendo obliquamente, e verticalmente, e aggirandosi a vicenda, ed unendosi ad altre, o sfuggindo più e meno velocemente in guisa, che sembravano corpetti animati, e ravvivati dall'azione de' raggi Solari con bellissimo spettacolo. Ho poi avvertito, che di là a pochi minuti, aggrinzandosi la lamina, più non comparivano ne' varj lor movimenti; benchè alcuni arrestati discernevanfi; nè umettando la lamina coll'acqua, nè riscaldandola a' raggi del Sole, risorgeva facilmente un simile spettacolo. Ho avvertito inappresso, che diverso egli era da quello, che si ha dalla intera macerazione delle foglie carnose nell'acqua, ove si vedono alla discesa diversa del fluido muoversi diversamente molti corpicelli, distaccati nella macerazione dalla sostanza cellulosa. Anzi ho notato, che, tenendo la foglia dell'aloè in macerazione per più giorni, li rami lucidi vascolari, divengono bianchi, e sfilati; mentre le stesse lor direzioni si fanno più inclinate, ed orizzontali senza gli angoli naturalmente ordinati. Li gruppetti erano divenuti villosi, come stellette bianche, ed alcuni fili quasi composti di globetti uniti. Nella tessitura alterata vi avea alcune bolle d'aria rotonde, diverse dalle naturali, e disgregate co' fili sceveri di tensione, e di contrattilità. La immersione poi della foglia dell'aloè nell'acqua per poco tempo diede un utile cambiameuto non solo per isorgere li fili vascolari più dilatati, e le bolle più mobili pe' medesimi, e nelle cellule

cellule del parenchima più grandi , e più facili allo scoppio , ma eziandio per riconoscere certi tubetti verticali vuoti , e lucenti , ove li laterali più sottili non comprendevano alcuna bollicella . Coll' immersione finalmente nell' inchiostro , avuta una leggera macerazione , riscontrai nel contorno de' pachetti un qualcuno , che era divenuto un pò rossigno . Nel mezzo della foglia talvolta ve ne ravvisai un qualche altro sì nell' aloè , che nella porcellana con molte macchie bianche , fugose ; onde conobbi , che anche nella midolla o vi ha una qualche diramazione particolare de' pachetti colla più fina tessitura , o che quelli dell' una parte incontrandosi con quelli dell' altra vi formano un composto talvolta più notevole , o che finalmente disciolti via maggiormente nell' asse li fili rappresentano una più fissa tessitura . Ho finalmente avvertito , che anche la lamina trasversa dell' aloè , riguardata a certo angolo di riflessione de' raggi Solari , appariva nel mezzo colle simbrie colorate , specialmente nell' asciugarfi , e nello sparire del fluido .

Nella midolla del girasole ben seccata , si scorge abbastanza nelle sezioni trasverse la tessitura retiforme ad aree esagona con fili dappertutto manifesti , ed intrecciati in modo , che le aree di una sezione non sono poste in un piano orizzontale , nè co' lati rispettivi simili , e variamente più lunghi , o più brevi , più sottili , e più grossi , e cogli angoli tuberosi . Sembrano le aree però minori di quelle dell' anello celluloso esterno , benchè de' fili medesimi prodotti , e diversamente risolti fabbricate .

La

La radice nelle piante , che sotto a diversi aspetti si rappresenta, si rilevò, che ritiene una struttura organica di parti, simile a quella del tronco, e de' rami, giusta le particolari ricerche in molte spezie. Recisa una lamina trasversa dalla radice della borragine, si rimarcò sotto un anello esterno, ben largo, ed un cilindro interno d'un diametro circa della larghezza dell'anello. Questo conteneva l'epidermide, e poscia il parenchima sugoso, e pellucido a lume trasmesso, pien di bollicelle, maggiori verso l'esterno, che all'interno, distribuite in raggi men patenti, e men regolati, altri retti, altri curvilinei, ed alcuni spirali con ramificazioni. A lume riflesso la superficie apparve ineguale in trasparenza. MostRARONSI alcuni fili, e bolle bianche eminenti colla sostanza congiugata. Procedendo nei fili all'interno, e tali vasi vescicosi radiali all'interno, formavasi un anello più stretto, e più regolare di raggi rettilinei più sottili, che formano la superficie più bianca. Nell'orlo esterno di questo vi si trovò qualche macchia da qualche pacchetto composto vascolare; di cui se ne riscontrò una serie circolare nell'orlo interno, che spettava anche all'esterna superficie del cilindro contenuto: poichè, distaccandosi questo da quello, in sulla superficie di questo vi rimasero li pacchetti de' vasi spirali. Li fascetti vascolari sugosi nell'orlo interno dell'anello della scorza presentavano una lamina sottilissima solcata nell'una superficie, e nell'altra, onde s'univa l'anello al cilindro; la quale osservata longitudinalmente non mostrò li pacchetti ascendenti così retti, e distinti, come li trasversi radiali.

L'area

L'arèa della sezione trasversa del cilindro era sparsa di parecchie macchie de' pacchetti vascolari , distribuite a foggia di circoli concentrici , e dimostrava la continuazione in più luoghi de' vasi sugosi radiali dall'interno del cilindro all'anello esterno . A lume riflesso le macchie de' pacchetti erano scabre, bianche, come de' vasi spirali, ed erano più fitte e minori verso la circonferenza , che verso l'asse, ove la sostanza spongiosa midollare distingueasi coll'esservi più stretta, e più biancastra con raggiolini li più sottili , che portavano quasi dall'a sostanza spongiosa o esterna più rara sino al centro, segnato da macchia più oscura . Nel centro vi riscontrai due mucchi, l'uno di tre, o quattro, e l'altro di due fascetti separati , ma comunicanti per certi rametti vascolari rossigni trasversi . Tra li due mucchi vi erano degli interstizj vuoti, e parve, che la serie de' pacchetti vascolari più interni terminasse in questi due mucchi centrali. A lume trasmesso la sostanza più intima del cilindro era attorno l'asse tutta piena di bollicelle eminenti, pellucide, maggiori verso al centro.

La lamina longitudinale, recisa lungo l'asse della radice, mostrò ad evidenza, che le macchie del cilindro erano sezioni de' pacchetti composti vascolari, ascendenti per tutta l'interna sostanza del cilindro, che si diramavano, ed anastomizzavano per ogni verso nell'ascesa; mentre l'anello della scorza presentava più visibilmente li vasellini trasversi. Osservando il principio superiore della radice, o il confine di essa col tronco, si scorre, che l'anello della scorza andava cambiando
dire-

direzione ne' fili trasversi, cominciando a sparire all'esterno, e a comparire più corti all'interno, cioè a farsi decrefcenti. Espandendosi verso il termine suo superiore l'anello cutaneo della radice, la sostanza spongiosa midollare apparve più rara terminando all'interno quasi in ispire. E nell'origine della scorza verde producevanfi quasi da queste spire li vasi curvilinei ascendenti della scorza.

Li pacchetti de' vasi opachi della parte interna cilindrica andavano mancando nel mezzo, portandosi a' lati, e formando due fascetti grossi, e densi, che tra essi contenevano una sostanza assai più spongiosa, onde passava la radice nel fusto. Osservabile fu il termine medio de' fascetti composti, cambiandosi in pellucidi, e bianchi a frangie, o a peli; mentre li pacchetti laterali si faceano più densi, e più larghi al confine della radice, e poi si restringevano a' lati. Bello a vederfi fu l'orlo superiore de' pacchetti oscuri, che, dispergendosi in alto, come in tanti fili, o peli bianchi, faceano comparire il cambiamento de' trasversi orizzontali in verticali. Dal fascetto laterale curvilineo più ristretto nascevano in un piano prima due, e poi le altre diramazioni ad angolo acuto. Ho però avvertito, che l'origine de' pacchetti vascolari de' fusti non si avea sempre dalla espansione, e divisione del fascetto laterale al confin della radice, poichè ne vidi al di fuori de' vasi distaccati, quasi provenienti dalla sostanza midollare spongiosa, granellota; sebbene nella maggior parte m'apparve la continuazione, l'espansione, e la diramazione de' pacchetti medesimi.

Nel-

- Nella radice del lapazio, tagliata in lamine trasversali, ho riscontrato, che l'anello esterno ha li raggi orizzontali, o li setti convergenti, che passano nell'interno del cilindro fino all'asse, ove si trova molta sostanza midollare più spongiosa, e con macchie bianche. Nel contorno del cilindro le macchie de' pacchetti vascolari sono triangolari, colla base alla superficie del cilindro, ed il vertice nella media sostanza di esso verso l'asse; sebbene alcuni pacchetti traforati giungono fino all'asse. L'area triangolare è tutta traforata; sicchè ne annoverai più di trenta forellini in alcune aree; ed alcuni fori apparivano nella stessa divisione dell'anello dal cilindro. La zona bianca de' pacchetti vascolari sugosi era più larga all'orlo interno dell'anello, e restringendosi verso l'asse continuava tra' lati triangolari dell'area vascolare, formando quasi de' setti bianchi tra le macchie forate, prodotti dal mezzo dell'anello all'asse del cilindro, o alla midolla. Molti fili orizzontali trasversi, quasi fili a palma, vi avea nell'anello, che, ridotti a tre, o a quattro nel suo contorno, passavano dilatandosi nelle aree triangolari, dividendole, e suddividendole, e giugnendo fino all'asse; dove l'area centrale era tutta cellulosa, pellucida, piena di bollicine, come ben apparve a lume trasmesso. Nella radice secca le aree bianche interne del contorno risalivano, mentre le triangolari si mostravano tutte forate, e si vedeano li setti continuare dall'una all'altra sostanza, essendo ristrettissimi nel passaggio, ed annessi sì all'uno, che all'altro orlo. Una lamina trasversa di tal

ra-

radice lasciata seccare sì, che bianca mostrandosi nella superficie a luce riflessa, riguardata a luce trasmessa rappresentò l' area centrale spongiosa co' fori diversi, e divisi da fili trasversi, li quali recedendo, ed approssimandosi alla sostanza bianca, si faceano minori, continuando però tra le aree, o macchie de' pacchetti vascolari fino all' anello sotto sembianza di setti verdolini spongiosi. Nel contorno però del cilindro massimi erano li fori de' vasi tracheali, e minimi al vertice interno dell' aree triangolari de' fascetti composti.

Del pari il cilindro interno della radice del rafano rusticano, tagliata attraverso ad un pollice sotto il picciuolo, presentò l' orlo esterno il più distinto, quasi un anello formato di pacchetti vascolari, li quali internamente verso l' asse più rari erano. Anche nell' asse si distinse un altro cilindretto, qual nucleo, con macchie diverse, alcune gialle oscure in area bianca. L' orlo esterno dell' anello, o scorza era di una sostanza spongiosa con molte ramificazioni, e dietro ad esso veniva una tessitura più rara, bianca, e piena di bollicelle senza fasci manifesti, sebbene molti fili grossi diramati, ed anastomizzati si videro; quali rinvenni nella sostanza del cilindro tra le diramazioni de' fascetti composti vascolari. Queste diramazioni alla parte superiore della radice vie più concorrono verso all' esterno, lasciandovi in mezzo una sostanza midollare spongiosa, granellosa, sugosa, e dalla loro unione si veggono trarre origine li pacchetti de' picciuoli. Ammirabile vi è il progresso dell' anello della scorza dalla radice

dice

dice al picciuolo per le molte inflessioni, espansioni, e contrazioni, reciproche del pacchetto vascolare. Il confine bianco dell'anello, e del cilindro molto ristretto superiormente è più ineguale, ove li fascetti nella sostanza della radice si fanno più espansi, ed in quella del picciuolo più contratti, e dove il confine della radice, e del picciuolo è tutto diviso, quasi una zona bianca dentata. Lasciando un pò. asciugare l'umore si videro prominenti li pacchetti, ed aperte porosamente le bocchette de' vasi contenuti nel loro contorno.

Nell'area della sezione trasversa della radice dell'ortica comparvero assai conspique le macchie bianche triangolari de' fascetti vascolari col vertice verso l'asse, che sono unite per setti a segmento di cerchio, sporgiosi, e varj di numero, e di figura, sicchè ne annoverai da 2. a 10; onde dall'alto al basso della radice il numero decrescea, coll'area media cilindrica spongiosa. Nel confine tra la radice, ed il fusto non solo si rimarcò un cilindro interno, ma anche le aree intermedie tra li molti setti verdi spongiosi, facendosi l'area media cilindrica più ampia, più pellucida, e più cellulosa, come faceasi più verde, e spongiosa la sostanza de' setti frapposta tra' pacchetti composti, e semplici.

Avendo osservato un ramo della radice profonda passare in un pezzo più grosso, più molle, men giallo, e poscia ripassare in sottile, robusto, gialletto, e di nuovo divenire più grosso, più molle, biancastro, e circondato ne' nodi da fili radicali, e fogliette molli insieme, e finalmente ne' nodi da sole fogliette tenere; ho

rin-

rintracciata la diversità della sostanza, e struttura interna colle sezioni trasverse a' nodi. E ritrovai nello stesso nodo, che li rami delle radici aveano de' fili, li più profondi dall'asse, e che li rami delle foglie gli avea-
no al lembo esterno de' pacchetti vascolari, perforati, e spansi verso la scorza. E notai, che li fascetti de' primi si seccavano, divenendo bianchi, e que' de' secondi, divenendo oscuri, e ristretti; la qual osservazione diede occasione a molte considerazioni, e risultati.

La scorza della radice legnosa del girasole, tagliata attraverso, mostrò la sua tessitura spongiosa co' pacchetti composti vascolari. Li fili trasversi, più e meno orizzontali di quella erano più grossi, e più lunghi de' verticali, onde comprendeano cellette più lunghe orizzontalmente, e più grosse all'esterno in serie decrescente verso l'interno. Levata l'epidermide secondo la lunghezza della radice, si vide la tessitura retiforme con moltissimi stigmi veri, pellucidi all'esterno, biancastri sull'interna superficie. E siccome avea osservato nel confine della scorza, e del legno del fusto di questa pianta molte macchie de' pacchetti vascolari, verdi all'interno, e bianchicce all'esterno, le quali esternamente appartenevano alla scorza, internamente al legno, per le quali vi avea una comunicazione tra quella, e questo; così non iscorsi alcuna macchia nella scorza della radice al principio del fusto. Nel passare da quella a questo formasi tra il legno, e la scorza un anello verdolino con fili orditi dall'esterno all'interno, onde la scorza presenta due lamine, una esterna spongiosa, e più sottile, l'altra in-

X X
ternà più grossa , verdastra , terminante in un anello bianco al confine della scorza , e del legno .

Tagliando per l'asse del fusto , e della radice della fitolacca una lamina longitudinale , osservai nella radice tre strati , crescenti di grossezza dalla circonferenza all'asse , ma che dal mezzo della radice più grossa all'insù vanno assottigliandosi , sicchè all'esterno termina in lamina più sottile , che gli altri . Il fine è nella parte parenchimatosa del confine tra la radice , ed il fusto alla parte esterna di questo . Nel confine di ogni strato li pacchetti vascolari frappesti erano massimi nell'asse , sebbene alla parte superiore della radice circa l'asse vi ha la sostanza midollare granellosa , e dura , in principio verdolina , e poi tinta di strie rosse , che vengono da questa sostanza , oltre un gruppetto rosso centrale , contenuto , qual cuoricino , tra il termine di unione de' pacchetti interni spirali , sotto il quale essi erano maggiori verso all'asse . Li pacchetti vascolari distribuiti in un anello verso il principio del fusto vanno restringendosi , e convergendo , finchè al principio della radice si espandono , e si immergono nella sostanza granellosa di figura ovale , dalla quale pur traggono principio li pacchetti vascolari della radice .

In altra radice più grossa della stessa pianta osservai similmente , che il pacchetto vascolare del fusto convergeva , quasi a contatto della loro sostanza , là dove era robustissima , e di là principiava la sostanza granellosa centrale , dal cui mezzo vedeanfi tanto nascere li fili discendenti della radice , che concorrevano a forma-

re

fe li fascetti vascolari della parte media, quanto li fili de' pachetti ascendenti del fusto, li quali espanfi ivi si trovano all' intorno, e molto duri nella stessa sostanza, nella quale la tessitura verde parenchimatosa del fusto conicamente vi viene, e si immerge.

In una lamina trasversa di altra radice della stessa pianta avea riscontrati quattro anelli bianchi, e quattro un pò pellucidi, oltre il cilindro interno, e l'anello della scorza all' esterno. La scorza avea li fili orizzontali assai brevi, uniti a vescichette in serie, quai raggi a corona; e poi seguiva una lamina repulissima bianca, ed il primo anello pellucido, e poi altro bianco, altro pellucido, ed in questo le strie radiali bianche, che trapassavano dall' uno all' altro; e questo era più largo del primo, anzi tutti sembravano proseguire più larghi col loro minor diametro. Nel mezzo de' tre anelli pellucidi videsi quasi una linea circolare più pellucida, attorniata da pachetti vascolari, ben ravvisati a lume trasverso. Molte linee trasverse di divisione vi si trovarono specialmente nel quarto anello, nella cui area pure vi erano molte macchie rossigne attorno l' asse. Facendo una sezione trasversa verso la parte superiore della radice, che passava per la sostanza granellosa, vi si scopersero in questa li moltissimi raggiolini di fili nascenti de' pachetti ascendenti, e discendenti. E ripetendo le sezioni per l' asse in lunghezza, si distinse, non venir essi dal centro a raggi rettilinei, ma da varj punti dell' area centrale a curve quasi paraboliche.

Fatte molte sezioni trasverse della radice della celi-
donia , non ho potuto così ben discernere la struttura
del cilindro , e dell' anello della scorza co' pachetti va-
scolari , come facendone alcune longitudinali . Le-
vando così tre lamine sempre più profonde , o prossime
all' asse , vi si svilupparono sin dalla cute de' fili tra-
sverfi , quasi in istrati orizzontali , e de' pachetti va-
scolari sugosi , manifesti dal colore aureo-giallo , prove-
nienti dalla scorza verso l' asse con varie direzioni , lun-
ghezze , ed anastomosi . Il color primo de' fili era di
vero scarlatto , ed il seguente degli altri sempre più
intenso , sicchè si giugneva al rosso verso l' asse . Così
rilevai , che li fili delle cellule nell' anello cutaneo sono
vascolari , e che quelli agli angoli delle aree cellulose
sono più grossi , e dilatati , e che al fine li fili trasverfi
giungono sino all' epidermide . La direzione delle strie
colorate attentamente osservata portò a questa determi-
nazione . Il cilindro concentrico mostrò all' interno li
pachetti , ed all' esterno la tessitura cellulosa . Li fasci
vascolari tracheali verso la parte superiore pareano con-
correre in tronchetti minori di numero , e ridursi alla
fine in un fascetto nell' asse , circondato da un anello
non retiforme , ma granelloso . Questo fascetto poi si
espandeva in cinque , o sei filetti per lato corrugati nel-
la grossezza di part. 1 della lamina , onde essi erano
sparsi a guisa di pennello su d' un piedestallo . Il filo
medio s'ergeva nel mezzo , e si vedea incrociarsi , com-
prendendo nello spazio intermedio una sostanza granel-
losa , sugosa , colorita , e poi divergendo terminava in

un

un globetto, come tanti altri fascetti laterali, dispersi nella sostanza granosa, ove si discerneano li tubercolerzi de' fili vascolari spirali. Al di sopra ascendevano due fascetti vascolari, cilindrici, divergenti, comprendendo l'appendice superiore di simile granellosa sostanza, che vi passava nella cellulosa media del fusto; la cui mutazione è tanto più ammirabile, quanto più tra' fili spirali la sostanza intermedia dimostra la gradazione nel color verde, ch'essa va prendendo. In altra radice simile osservando di nuovo il corpetto aureo-bruno, scopersi, che esso è posto nell'area della sostanza biancastra, granellosa, e che ve ne avea degli altri a' lati, donde si genera il colore più intenso, ed altri inferiormente, e che la sostanza granosa viene divisa da' fili vascolari spirali, pur tinti di color aureo-oscuro. Avanti il concorso di questo sta il corpo glandulare in ogni luogo; e al di sopra di esso seguiva la sostanza bianca granellosa, o verdolina, in cui si vedeano a maraviglia gli elementi de' fili de' pachetti vascolari.

Nella radice della parietaria, facendo una sezione superiore, si vide l'area della parte legnosa più colorita verso la circonferenza, mentre nel fusto vi era più la scorza; e perciò indagando trovai la continuazione de' fili colorati dalla circonferenza della parte legnosa alla corteccia. Le linee radiali trasverse aveano de' fili colorati nell'area del legno, ma non verso l'asse. Laddove nel fusto rinvenni le linee rosse anche secondo la lunghezza dell'asse, ove era della sostanza molto spongiosa, e molto rossa al confine colla scorza, e nella

scorza medesima. Si videro li pachetti rossi negli stessi strati, recisi lungo l'asse; nè si videro continovari, ma interrotti li fili rossi ne' vasi. Notai in questa radice, nonchè in quella della celidonia, che il colore, dalla parte media superiore verso l'inferiore della radice, e la superiore del fusto, va divenendo più diluto, e più nell'interno del fusto, che nella scorza. Nell'orlo interno delle macchie de' pachetti vascolari bellissimo era il colore vinoso. Questo più vivo nella parte più superiore, ed interna della radice non mostra ivi l'origine? E nella scorza apparendo più vivo non prova la sottiliezza de' pareti maggiore, oppure dimostra, che li vasi interni della radice continuavano nella scorza, o finalmente, che l'azione della luce esterna vi influisce? Da queste diverse sezioni non solo compresi, che nella radice v'ha li pachetti vascolari composti di grandissimo numero, e che v'ha insieme le più frequenti anastomosi, risolvendosi alla fine, e mettendo foci nella parte più centrale della pianta; dove avvi una spezie di cuoricino, a cui li vasi assorbenti della radice portano il fluido acqueo-aereo succhiato. Quivi pure la sostanza midollare ha una particolare tessitura granellosa, consistente, densa, colorata.

Avvi anche all'esterno delle parti sì dure, che molli prominenti, come le spine, li peli, e li villi. Osservando sulla foglia della borragine le spine coniche acute, maggiori sulle coste, che sulla sostanza verde della foglia, e più nella superficie inferiore, che superiore; notai la radice, o il bulbo, che sporge all'infuora, qual
pez-

pezzetto cilindrico, o conico ottuso, più grosso, tessuto all' interno di fili verdolini, gialletti, opachi, non pellucido, come è la parte superiore. Questa poi si trovò pellucida all' interno, che sembrava un tubetto di vetro pieno d' acqua; e all' esterno qual altro tubetto vuoto. In altre spine il pezzetto pieno diverso era in lunghezza, ove in altre era del tutto pieno, ed in altre del tutto vuoto. E reciso poscia il tubo pieno, si restrinse l' umore più abbasso; e, recidendovi la parte vuota, l' umore restava a suo luogo; finchè, giunta la sezione quasi al lembo dell' umore; abbreviassi la lunghezza del pieno; e la parte superiore di questo mostrò la parte del pezzetto più prossima alla sezione unita. Il bulbo della spina nel parenchima in certa riflessione della luce a piccolo angolo compariva un punto lucidissimo, dandovi appresso uno spettretto; laddove a maggior angolo risplendeva nel sito del bulbo il parenchima, che dimostrava una fovea molto maggiore, di quel che porta la tessitura cellulosa di esso. Levata, ed esaminata la spina a lume riflessso, e trasmesso, si scorre, che il punto lucido derivava dall' umore contenuto sopra del bulbo, che riflettea la luce, qual bollicella, o globetto sferico di vetro. Simile struttura rilevai nelle spine dell' ortica; senonchè queste erano più sottili, e più dure, sporgendo il bulbo più all' infuori, ed aveano il pezzetto cilindrico maggiore rispettivamente della parte conica, essendo una quarta parte circa in lunghezza. Quivi pure viebbe la pellucidità maggiore nella conica, e la tes-

fitura reticolare nella cilindrica verdolina, la quale ha il bulbo latente, e distinto ad ogni modo dagli stigmi, o macchie bianche ovali, che vi sono in gran numero disperse sulla superficie, più conspiciue, più bianche, e più pellucide nella faccia superiore della foglia. Questi stigmi gli osservai ben gonfi in tempo di freddo nella foglia la più tenera dell'ortica; e ne ho potuto vedere qualcuno connesso coll'epidermide distaccata, e qualche altro col parenchima, qual vescichetta piena di umore con punto or medio, or laterale più lucido; più rari essendo nel tusto, e nel picciuolo. Anche nella parte conica pellucida de' peli, o spine vi ho distinto talora il licore contenuto sino alla metà della lunghezza, e vi scorsi sino il lume interno coll'apice bianco. Li peli, o filetti differiscono di qualità nelle diverse piante, e nelle diverse parti loro; altri essendo sulle foglie, altri su' fiori. Li peli della foglia della salvia son molto diversi da quelli del semprevivo maggiore, e que' della faccia inferiore diversi da quelli della superiore. Nella foglia della salvia si veggono essi spuntare dalle coste, e da' rami, essendo più lunghi, più folti, più opachi, più scabri, e più intralciati nella faccia inferiore. Tra li bulbi anche nel verno vidi molte vescichette rotonde, bianchicce, piene di sugo, più e meno pellucide, ben grandi, eminenti, simili alle vescicolari descritte da M. Guettard, distinte da' bulbi de' peli, che mostravano derivare dalle macchie rotonde opache. Levando diligentemente un lembo dell'epidermide della salvia dalla faccia inferiore, si ravvi-

so il filo annesso all' area reticolare esterna. E, facendo una sezione lungo la costa della foglia, vidi li bulbi, come tanti granellini cinerici, e rotondi sulla superficie del perenchima. La parte promineute esterna de' bulbi si discerne spezialmente nella faccia superiore della foglia, cioè in su' tubercoli verdi, dal cui vertice escono li peli a mazzetto ben lunghi, divergenti, non attorcigliati, de' quali ne annoverai più di 30. in su d'un tubercolo; mentre altri vi spuntano più lunghi da' solchi delle coste, come avea veduto nella faccia inferiore, ove col loro intreccio covrivano le fosse opposte a' tubercoli. Nella foglia della parietaria li peli si videro separati tra loro, quasi conici ben lunghi, più e meno retti, e più frequenti lungo le coste, e nella circonferenza della foglia; e più lunghi, e più retti, e più spessi nelle fogliette le più tenere. Erano li bulbi prominenti dalla superficie della foglia, e principalmente nella faccia superiore, più e meno opachi, ma distinti dagli stigmi pellucidi li più manifesti nella stessa faccia superiore, e assai più nella foglia matura, che nella più tenera, ove sono gli stigmi minutissimi. Anche nella foglia dell' orecchia d' orso li peli sono corti, retti, e separati; ma più grossi rispettivamente, e meno acuti nell' apice; come lo sono pure nella viola odorata. Nelle due faccie della malva li peli sono più rari, e più retti, nè mostrano il bulbo fuori della superficie, come nelle foglie indicate. In ambe le faccie della foglia del semprevivo maggiore quanto più sottili, villosi, at-

torcigliati, e velanti le aree si scovrono bene nella state; tanto più retti, e grossi lo sono in ogni stagione nella circonferenza, avendo una direzione obliqua discendente. Nell'interno, di questi grossi peli pellucidi vi si distinse un filetto opaco nell'asse, ed una tessitura retiforme manifesta alla base. Non si scernono i peli delle foglie tubulose de' narcissi, ove oltre gli stigmi li più notabili i fili spirali son li più distensibili. Nel contorno delle foglie li peli son di diversa grossezza, lunghezza, direzione, sicchè sembrano spine, denti, cornetti, e globetti più e meno pellucidi, bianchicci, rossigni, e d'altro colore, più e meno duri, e cartilagineosi. Ho poi osservato, che la superficie di alcuni peli è levigata, ed egualmente pellucida, e quella di alcuni altri con prominenze bianche, cinericcie, più e meno rotonde, quasi intrisa di granellini, ma diversamente nelle diverse foglie, e in diverso tempo. Nel tempo del verno li trovai nella maggior parte delle piante più raggrinzati, più brevi, ed ineguali nella pellucidità, ed aspersi di parti sugose concrete, che rappresentano li granelli, che ora nel mezzo, ed ora nel vertice si trovano, il quale sembra talvolta biforcuto, e talvolta ottuso, or bianco, ora oscuro.

Altre spezie di peli si trovano nelle corolle, negli stami, e ne' pistilli. Sulla superficie della corolla del semprevivo minore rosso vi avea le gran vesichette particolari, ove le petale sono grosse, e sugose cogli interstizj pellucidi; e vidi simili tubercoli senza peluzzi nella corolla della viola. Piccoli son que', che spuntano dal

dal fin della corolla della campanella annessi, alle per-
 je, e al filo degli stami rispetto a' simili della veronica.
 Il lungo tubo della pervinca superiormente alle fanci
 offre molte frangie di fili pellucidi, e bianchi, che es-
 cono da' lati del tubo, ed ascendendo s'incurvano a
 paviglione, e coprono gli anteri; sebbene anche la
 parte inferiore del tubo getta de' peli conici, pellucidif
 con filo sottilissimo opaco nell'asse loro, più e meno
 orizzontali. Nella salvia l'orlo pelofo è al principio
 del tubo della corolla, formando un anello non intero.
 Anche li fili degli stami del leandro sono coperti di
 peli orizzontali, ascendenti, de'quali nel tubo della co-
 rolla in ogni pezzetto ve ne ha cinque mazzi, o pen-
 nelli divergenti verso l'asse. Gli anteri, avendo due
 fili laterali, robusti, duri, legnosi, ne hanno uno in-
 termedio pelosissimo nell'esterna superficie cilindrica, il
 quale ascendendo lungamente s'attorciglia, e s'ingrossa
 insieme; e ciò facendo tutti cinque gli anteri, vi si for-
 ma un fusto molle, pelofo. Particolari son quelli dell'
 anagallide composti di globetti connessi in una linea l'un
 dopo l'altro, tali essendo dall'alto al basso, e simil-
 mente pelofo è la superficie dell'anello comune degli
 stami. Questi globetti furono sin dieci, o dodici in
 una serie.

Dopo tali osservazioni sulle parti diverse prominenti
 dalla superficie esterna, ed interna, e da' margini delle
 piante, ho indagato con molte sperienze, quali parti
 il fluido artificiosamente percorra, e sin dove vi giun-

ga,

ga, immergendo li fusti, li rami, le foglie, i fiori, le radici nell'inchiostro per diverso tempo.

Il fusto del lapazio, per molte ore rimasto nell'inchiostro, nelle sezioni trasverse avea le macchie de' pachetti interamente annerite, ed imbevute di fluido, da cui colla pressione usciva l'umore non tanto da' tubi tracheali, quanto da' sugosi, pieno di bolliccine a guisa di saliva, onde si dedusse la comunicazione tra' vasi tracheali, e li sugosi, e la decomposizione del sugo dall'acido dell'inchiostro.

La radice della fitolacca si era tenuta per un giorno immersa, quando nel seguente si trovò tutta la porzione immersa macerata, e li pachetti vascolari verso l'asse tutti dipinti di nero, formanti una macchia nera per tutta la lunghezza, indi li vasi dell'anello primo più di quelli del secondo esterno.

Il fusto co' rami, co' picciuoli, colle foglie, e col fiore del girasole era stato lungamente immerso, cioè per diciotto ore circa, quando, esaminandovi li pachetti vascolari per tutto il tratto superiore, li trovai tinti di nero tra la scorza, ed il legno non solo per tutto il fusto, ma pel picciuolo, e per la foglia sino all'estremità. Anzi il progresso de' fili neri ne' pachetti si vide alla radice, e nella faccia inferiore delle foglie del calice le più alte, senza alcun vestigio nella faccia di queste superiore, o nella sostanza più porosa. Nessun indizio di color nericcio vi ravvisai nella midolla sino alla radice del calice; donde nella larga sostanza quasi midollare, che vi segue, gli ho bene distinti; non però

però così bene nella lamina, su cui poggiano le bafi de' pericarpi.

Molta varietà nell'ascesa, e penetrazione dell'inchiostro apparve ne' pachetti vascolari del blito, poichè in alcuni vi era una sola stria nera, in altri due, e tre, e più, dove alcune strie erano continue, e dove parecchie interrotte; sì che il pezzetto vuoto vascolare mostrava un diametro minore; nè vidi li fili neri laterali, come nelle foglie, ne' calici, e nelle corolle. Postovi lo stesso fusto nell'inchiostro a rovescio, immergendovi la parte superiore, rinvenni similmente l'ascesa dell'inchiostro pe' pachetti vascolari, dove a colonne continue, e dove interrotte, altre più prossime all'asse, ed altre alla corteccia.

Coll'immersione più a lungo del fiore del convolvolo bianco si videro in sull'esterna superficie alcuni fili nerastri, e due notabili a' lati del pistillo. Trovandosi nel contorno semicircolare, che formasi tra uno stame, e l'altro della corolla cinque punti neri, cioè due laterali, ed un medio, si vide il progresso delle strie nere secondo la superficie convessa della petala; mentre pel mezzo dello stame un filo nerastro scorrevane l'asse, confermato dalla macchietta oscura alla sezione trasversa. Laddove per simile sezione vidi li punti neri nel calice interno più prossimi all'interna superficie, ove erano minori le anastomasi, di quel che nel calice esterno.

Il fiore di altea era stato immerso nell'inchiostro per qualche maggior tempo, quando la radice del calice
die-

portava dieci, o dodici macchie nere verso il lembo esterno, sebbene le strie nere discernevanfi più dall'interna, che dall'esterna superficie pelosa. Nella sezione di ogni petala eravi due grosse macchie, di quà e di là della parte media; e distaccando la grossa sostanza pelosa colla lamina interna, seguivano due grossi vasi, ed indi altri molti rametti laterali, li quali parevano uniti alle fibre gialle nell'interna, ed alle bianche nell'esterna superficie; e così li distinfi da una tale sostanza robusta d'altro genere vascolare. Parvemi veder un tenuissimo filo nerastro in un canale bianco, qual vidi sanguigno in alcune arterie ne' gangli dell'uomo.

Immerso parimente il fiore della cicorea nell'inchiostro, nel calice si annerarono quattordici, e più macchie tra la scorza, e l'asse; ove erano li fili neri prodotti pel calice, pe' tubi interni, e pel pericarpio, formando un arco ben grosso, e nero a' lati, e al di sopra attorniano la sostanza media spongiosa. Da questo seguivano li rametti, che conduceano alla superficie esterna de' tubi interni.

Un fiore di bellide dall'inchiostro avea tratte le strie similmente nerastre nel calice, e nella corolla distintamente, quando un altro si vide nel fondo celluloso tutto annerito. Anche il fior maschio del girasole dal solo calice immerso nell'inchiostro portava nella corolla de' fili neri; e tutto il tubo si era riempito di inchiostro, asceso sopra il livello, senza che le cellule mostrassero assorbimento. La corolla femminile di questa pianta era stata immersa solo per mezz' ora, e le
coste

coste medie, e molte laterali per tutta la lunghezza s'erano tinte di nero per ogni verso .

Quinci ho voluto riscontrare le differenze ne' diversi tempi d' immersione di varie piante. Un fusto adunque col pedunculo, e colla foglia della fitollaca ho lasciato immerso nell' inchiostro verticalmente per un' ora circa, e trovai l' inchiostro asceso a varie altezze ne' vasi spirali, e distribuito dove a lunghe colonne, e dove segregato in pezzetti più e meno globosi colle bollicelle di aria frapposte. E premendo la lamina de' pacchetti vascolari recisa, l' inchiostro ascendeva tosto, ed usciva dalle sezioni superiori, ed in altre giugnava in alto; e cessando di premere ritornava, e discendeva la colonnetta nera. Nell' uscire poi ho osservato, che il contorno della sezione era nero, il mezzo pellucido, e che vi usciva una bollicina aerea. Nella larghezza del pacchetto sugoso non v' avea alcun segno di nero per una tal immersione.

Durante l' immersione l' inchiostro per minuti 14, in un vasetto del fusto era asceso a part. 126, in un altro in minuti 2. a part. 12, mentre nel picciuolo della foglia a part. 20; dove in altro fusto in minuti 9. a part. 24. con colonna continua si è riscontrato.

In un altro pacchetto del fusto, reciso all' origine della foglia, in minuti 4 la colonna avea descritto lo spazio di part. 18, mentre nel picciuolo era giunta a part. 22. In altro fusto nello stesso tempo a part. 14, e nel picciuolo a part. 18; dove in questo un pò appassito in minuti 2 a part. 21 in un solo vasettino si è osservata l' ascesa.

Nella foglia d'aloè ben larga dopo ore 3 d'immersione era asceso l'inchiostro a part. 33 in un solo fascetto spirale, dipingendolo di color rossiccio, o aureo oscuro; ed essendo il vaso ineguale di diametro, e di colore, sicchè in alcuni luoghi pareva disciolto in villi. Talvolta distinti sì un pacchetto interno, che un esterno similmente colorato, ma la parte media sugosa priva affatto di colore. Nessuna mutazione vi ebbe nella sostanza verde cellulosa, nessuna nell'interna argentea pellucida, e specialmente ne' rami angolari. Notai, che alcuni vasi spirali erano senza alcun colore, ed altri lo avevano ad intervalli. Anche nel bellico di venire sol qualche filo esterno colorato vi era a poca altezza di part. 10; sebbene l'immersione era durata per ore 3. Una foglia di porcellana per ore 5. d'immersione nell'inchiostro si tinse tutta nel tronco, e ne' rami sino alla circonferenza di atro colore, quantunque vario d'intensione. Alcuni pezzetti glandulari, come condotti escretorj, tinti erano, e specialmente di quà e di là del tronco maggiore. Sembrava ella così macchiata di nero, che le macchie bianchicce o gli stigmi legittimi nella superficie inferiore erano pure anneriti.

Immerso il picciulo della foglia di cardo, si ebbe il pacchetto spirale nero affatto, ma l'anello sugoso ancor bianchiccio colle glandulette, o vescichette angulari trasverse, giallette, essendovi delle altre vescichette maggiori al confine dei vasi spirali.

Dalle osservazioni, e sperienze particolari brevemente indicate si resero cogniti que' principj di struttura or-

ganica, li quali aggiunti alle scoperte de' più celebri Naturalisti, avrebbero servito alla soluzione di parecchi problemi di economia vegetabile. Se il cel. de Saussure nelle sue osservazioni sulla corteccia delle foglie non solo avesse veduto il reticolo corticale vascolare, e li corpetti trasparenti, quali glandule miliari; ma riconosciuta la qualità sì de' vasi del genere spirale, che della tessitura retiforme per aree esagona co' gruppetti, o tubercoli negli angoli; ed avesse sviluppato il meccanismo de' corpetti trasparenti colle loro aperture nell'arresto del fluido, e colla relazione a' corpetti bianchi sotto l'epidermide, connessi con questa, e col parenchima; si avrebbe meglio determinata la meccanica della scorza con certa relazione immediata agli utricoli del tessuto celluloso per la funzione delle foglie. Che se avesse rimarcata una simile tessitura di tale involucri nelle altre parti della pianta, come delle radici, de' fusti, de' rami de' picciuoli, del peduncolo, della corolla, e d' altre parti del fiore con alcune differenze; avrebbe esteso l'uso dell'involucri generale, e particolare per l'assorbimento, e per spirazione, relativamente alle parti interne. Dietro a tali principj oh quanto profondamente il gran Contemplatore della Natura avrebbe estese le sue ricerche sull'uso delle foglie, e contemplata la ragione della differente per spirazione dell' una, e dell'altra faccia!

E se il Duhamel nella tessitura cellulosa oltre l'intreccio di vasi delicatissimi, immersi negli utricoli trasversalmente, avesse veduta la qualità loro non sem-

E

pli-

plice, ma composta de' fili spirali, e sugosi con una disposizione sempre retiforme in aree similmente esagone, ma in piani diversi, e cogli ammassi di granelli miliari aderenti, e vestiti del color più, e meno verde; la struttura degli utricoli del Malpighi, e del Grevv si farebbe da lui ingegnosamente illustrata. E se avesse scoperto, che una tale tessitura si trova non solo negli alberi, ma ancor nelle piante erbacee, nè sol nelle foglie, ma anche ne' più piccoli, e gentilissimi fiori, sì verso la corteccia, che verso l'asse, e sì figurata in anelli, o zone di diametro, e di larghezza diversa, con raggi, o setti trasversi pur varj in origine, e relazione all' involucrio esterno, a' fascetti vascolari, ed alla midolla; atrebbe forse con più sicurezza affermato, che il parenchima non è sì semplice, quanto si credeva, neppur nel bulbo delle radici, ove l'epidermide stessa ha li suoi più frequenti stigmi assorbenti.

E se cogli stuoli, ed aggregati delle bollicelle acqueo-aeree, ordinate in serie uniformi, ma maggiori verso la circonferenza, fosse stata cognita la vera costruzione delle cellule, tessute non di lamine larghe, ma di fili vascolari sottilissimi, distribuiti con certa inclinazione, e connessi in certo modo, che presentano in un piano le aree esagone, di varia dimensione ne' lati e negli angoli; il gran Contemplatore della Natura avrebbe determinata la causa de' punti lucidi nel parenchima delle foglie, riconoscendo il meccanismo di questa parte la più acconcia all' opera della vegetazione. Se dopo il Reaumur annotò a maraviglia questo insigne Naturalista

M.

M. Bonnet la figura delle cellette negli alveari delle api, come la più acconcia per contenere il massimo spazio colla minima quantità di materia, giusta le dimostrazioni sublimi analitiche del Sig. Koenig; quanto più avrebbe il genio Ginevrino contemplata la fabbrica del parenchima vegetabile, animata non solo dalla forza insita elastica de' funicoli spirali, ma dalla molla eziandio dell'aria, distribuita in globi immensi, ed applicata immediatamente alle corde esagono vascolari! Ritrovandosi simili aree nella epidermide la più fortile, non si avrebbe inferito, che una tal figura esagona, specialmente essendo ineguale, provenisse necessariamente dal corpo rotondo, molle, e flessibile della bolla racchiusa, ed appostavi. Sarebbesi anzi indagata, e determinata la ragione più sufficiente per la più congrua apposizione della lamina sugosa nella espansione dell'aria contenutavi, e per la distensione, e pressione uniforme de' fili vascolari, opportuna alla conservazione costante del moto del fluido più e meno equabile ne' piani inclinati, e connessi con certa dimensione angolare.

Se, come il Malpighi riconobbe l'esistenza, e determinò la struttura spirale de' vasi tracheali nelle parti diverse delle piante, circondati dalle fistole legnose; avesse il Duhamel rimarcato, che le spire non solo non sono di lamine, ma di funicoli composte di fili torti, e si fosse conosciuta la differenza de' vasi tracheali degli insetti, vi avrebbe molto meno per l'analogia accordato al Malpighi l'uso costante della semplice aria.

di quel che creduto col Grevv esservi in tai vasi talvolta del liquore. Che se avesse egli inoltre veduto il vero fluido misto colla varia adesione, movimento, e getto ne' vasi spirali delle piante, nè vi avesse potuto scovrire un simile nelle trachee degli insetti, giusta le nostre osservazioni sì degli uni, che delle altre, ed avesse ravvisata la comunicazione de' pacchetti interni spirali cogli esterni tugosi per anastomosi, e riconosciuta la produzione degli uni, e degli altri con innumerabili anastomosi nel parenchima, e nella cute sino all'epidermide; si sarebbe considerata decisa la questione della circolazione nelle piante. Ma, se inappresso si avessero comprese le particolari anastomosi de' pacchetti spirali tra loro nelle radici, nelle foglie, e ne' fiori, e distintamente in certe loro parti; si avrebbe anche contemplata la gran provvidenza della Natura, che per serbare li due principj essenziali della nutrizione, e della fruttificazione adoprà tutti li mezzi per riparare coll'una parte al difetto dell'altra. Se finalmente si avesse considerato il difetto degli stigmi veri, e l'esistenza de' peli di varia maniera nelle corolle, negli stami, e ne' pistilli coll'effluvio odoroso, che vi scaturisce da quelli; non si sarebbe inferito, che li peli son veri organi esalanti dell'umore il più tenue, ed essenziale, e che gli stigmi sì frequenti nelle foglie sono gli organi assorbenti del fluido aqueo-aereo? E ben riconosciuta la risoluzione de' vasi spirali nella parte interna centrale tra la radice, ed il fusto in una sostanza di suo genere nodosa, granelloso, e di vario colore.

lore ; non si avrebbe conchiuso , che da questa parte organica , e centrale , come da un cuore si generi , e diffonda al circolo generale il sugo proprio della pianta ; mentre l'aria da varie parti , e per varj mezzi introdotta , e concorsa v'influisca all'ottima formazione ?

Se le piante in generale naturalmente hanno la più florida vegetazione nell'aria impura atmosferica , ed in particolare le aquatiche , e se artificialmente l'aria fissa , o gas acido carbonico disciolto nell'acqua , dimostrassi più efficace per l'economia vegetabile ; chi non crederà , che il fluido aqueo - aereo , poppato dalle radici , e trasportato pel sistema de' vasi spirali contenga una tale specie di aria , la quale combinata colla luce , penetrata nella scorza , e nel parenchima , perfezioni la grand' opera della vegetazione ? E se le foglie , assorbendo per gli stigmi l'acqua , si ben disciolta in vapore dalla facoltà aerea dell'atmosfera , portano pure all'interno simile aria atmosferica ; mentre per le stellette , e per li peli delle foglie direttamente esala l'aria pura , o il gas ossigeno dall'una , e dall'altra superficie , ed indirettamente raccolgonsi , e ritengonsi pel più facile assorbimento le belle aqueo - aeree ; chi non ammetterà l'interna decomposizione in qualunque maniera prodotta ? Essendosi dimostrato dalle più recenti sperienze , che l'aria fissa , o il gas acido carbonico , agitato nell'acqua , si decompone nell'aria sfogisticata , o gas azotico , e nella desfogisticata , o gas ossigeno , ed essendosi rilevato , che gli acidi vengono cangiati in gas ossigeno dall'azione del fuoco , e della lu-

luce; non senza gran ragione si può credere dal celi Senebier, che il gas acido carbonico per l'azione della luce nelle foglie si decomponga nell'ossigeno, e nell'azotico. Che se, questo trattenuto nell'elaboratorio vegetabile come il più opportuno, v'esalasse di quello gran copia, restandovi qualche parte combinata col primo per formare il mucofo, il glutinoso, la gomma, la refina, l'olio volatile, lo zucchero; s'intenderebbe più il processo de' fenomeni, di quello che la causa immeditata della risoluzione, e degli effetti del fluido aqueo-aereo. Nonpertanto, se la luce Solare ha la facoltà di eccitare la potenza insita de'vasi spirali sull'epidermide, e nel parenchima delle foglie, e de'fusti, mentre il fluido aqueo-aereo la ravviva nelle radici, e nell'interno della pianta; chi non vede, che quindi l'energia può divenir la più notabile nel parenchima delle foglie? Essendovi le bolle aqueo-aeree quai globi lucidi, esposte all'azione de'raggi Solari, non devono formare de'foci interni, eccitandovi il massimo calorico per la fermentazione, e decomposizione delle bollicelle nelle cellette del parenchima, non che la contrazione de' fili; e vasi spirali colla espansione della molla elastica aerea per un più rapido moto, ed una più facile decomposizione delle bollicine ne'rubetti spirali? Qual maraviglia adunque, se dopo una leggera macerazione, e calore alla più minima pressione rapidamente corressero ne'vasi spirali le bollicelle, ed a vicenda o uscissero, o ritornassero indietro, e se talvolta, alcune si muovessero, ed altre rimanessero ade-

ren-

renti, ed immobili, nè le mosse si toccassero facilmente? Che se, mentre il gas acido carbonico, soffre una tal mutazione, anche l'aqueo fluido, o l'idrogeno combinato coll'ossigene si decomponesse; s'intenderebbe forse facilmente nell'et'alazione del gas ossigeno la raccolta dell'idrogeno, e la genesi de' sali, degli olj, delle linfe, là dove specialmente vi rimane all'interno più parte di aria pura, come ne' fiori? E se il verde colore del parenchima delle foglie, e della scorza venisse dalla luce combinata col gas acido carbonico; mancando questo colore nel parenchima de' fiori, come indicai, confermerebbesi la prevalenza in essi del gas idrogeno, e l'absenza del carbonico. E da questo principio si deriverebbe forse il color bianco, e la secchezza propria della midolla: co' colori misti, che vi appariscono a certa obliqua incidenza, e trasmission de' raggi Solari? Se a certo angolo d'incidenza alcuni raggi vi entrassero nelle prime aree, e s'infletteffero, e poi dalle ulteriori per l'umore tenuissimo olioso si rifletteffero; nascervi potrebbe il colore misto per li raggi trasmessi, inflessi, e riflessi irregolarmente alla diversa larghezza e grossezza de' fili, e numero delle aree. Che se il sugo de' vasi proprij sia di certo colore, e questi colle più sottili, ed estese ramificazioni si dispergano nelle corolle de' fiori; qual maraviglia, se fin dal più intimo del calice si videro li vasi colorati nelle petale, negli stami, ne' pistilli, il cui colore all'azione de' raggi Solari e dell'aria cambiavasi di intensione? Il color verde, che ri-

mane

mane al parenchima molto macerato, e il bruno acquistato da' granelli glandulari, ed il rossigno indotto ne' pachetti spirali dall'inchioostro nell'aloè, e in altre piante, ed il vario colore ne' fascetti sugosi della celidonia, esposta all'aria, ed alla luce, danno occasione a molte altre considerazioni; non altramente, che la celerità, e l'interruzione diversa del fluido infuso per la distinzione dell'aria rinchiusa nelle bollicelle, e la frapposta.

Se da tali osservazioni, sperienze, e considerazioni venisse giudicato, che non tanto la struttura organica delle piante legnose, indagata dal Malpighi, dal Grew, Hales, Duhamel, Bonnet, Hill, quanto quella delle erbacee resta sviluppata con nuove scoperte, che possono servire di qualche utile aggiunta nel sistema vegetabile; io mi lusingherei di aver seguita la traccia desiderata dal cel. Ab. Spallanzani, il quale rimarcando l'eccesso de' nomi nella scienza vegetabile eccita ognuno a penetrarvi più addentro nel meccanismo, specialmente dell'erbe, dopo d'aver egli sagacemente rintracciata la grand'opera della fecondazione dei sessi in questo regno. Alcune osservazioni sulla struttura, e rapporto del pistillo agli stami, e sulla polvere fecondante a corolla chiusa ed aperta, ed alcune altre sulla struttura de' nodi colla relazione di questi al fusto, e alle radici, e con quella delle radici al fusto formano una Memoria particolare per la teoria della fecondazione naturale, e per quella de' germogli, e della moltiplicazione.

I L F I N E.

92943058





HUBERT

Chevalier de la



GOFFIN

Légion d'honneur.

*„ Je veux les sauver tous,
ou ne pas leur survivre „*

Deposé à la Bibliothèque Imp.